

Ngộ độc cấp paracetamol (acetaminophen)

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 23 Tháng 4 2017 08:28 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 23 Tháng 4 2017 08:51

Bs Trần Vũ Kiệt - Khoa ICU

I. ĐỊNH NGHĨA:

- Paracetamol là thuốc giảm đau hạ sốt được sử dụng rộng rãi nhất, hiện có rất nhiều sản phẩm thuốc khác nhau.

- Ngộ độc có xu hướng tăng lên ở nước ta, đây là loại ngộ độc dễ gặp nhất trong số các bệnh cấp tính, chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời là khi bệnh nhân lạm dụng paracetamol để điều trị với mức độ quá liều lặp lại nhiều lần. Thời gian cũng là nguyên nhân hay gặp.

- Ngộ độc biểu hiện chính là viêm gan có thể dẫn tới suy gan cấp và tử vong tuy nhiên nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời bằng N-acetylcystein (NAC) cũng dễ dàng cứu sống bệnh nhân.

Nguy hiểm của paracetamol (acetaminophen)

Viết bởi Biên tập viên

Đăng ngày 23 Tháng 4 2017 08:28 - Lần cập nhật cuối: Đăng ngày 23 Tháng 4 2017 08:51



Nguy hiểm của paracetamol là một vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe con người. Paracetamol là một loại thuốc giảm đau và hạ sốt phổ biến, được sử dụng rộng rãi trong nhiều trường hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng quá liều hoặc kéo dài có thể dẫn đến tổn thương gan, thậm chí là suy gan cấp tính. Các triệu chứng của tổn thương gan do paracetamol bao gồm mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn mửa, đau bụng dưới sườn phải, vàng da và vàng mắt. Nếu phát hiện các triệu chứng này, cần ngừng sử dụng thuốc ngay lập tức và đi khám bác sĩ. Việc sử dụng paracetamol đúng liều lượng và thời gian là rất quan trọng để tránh các biến chứng nguy hiểm.