

Bs Lê Nguyên Vũ - Khoa Phẫu Thuật

Ung thư vú là loại ung thư hay gặp nhất ở phụ nữ, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ nhiều nhất trên thế giới. Trong những năm gần đây, việc chẩn đoán và điều trị ung thư vú đã đem lại nhiều kết quả tốt đẹp cho bệnh nhân ung thư vú.

Nội hạch nách là biện pháp điều trị chuẩn để loại bỏ bệnh nhân ung thư vú. Tình trạng di căn hạch nách cung cấp thông tin cho quyết định điều trị tiếp theo và tiên lượng. Tuy nhiên, nội hạch nách cũng đem lại nhiều biến chứng và di chứng, đặc biệt là phù bạch huyết cánh tay. Nội hạch nách không mang lại lợi ích nếu hạch không di căn.

Sự phát triển của sinh thiết hạch gác đã làm thay đổi phương pháp đánh giá hạch nách trong ung thư vú, là phương pháp chọn lựa thích hợp để loại bỏ bệnh nhân ung thư vú giai đoạn sớm.

Hạch gác trong ung thư vú là một hoặc một số hạch đầu tiên tiếp nhận dòng lưu bạch huyết hoặc di căn ung thư vú tới, là hạch có nguy cơ di căn cao nhất khi có di căn vùng nách.

Khi hạch gác âm tính thì hầu như các hạch nách còn lại khác cũng chưa có di căn ung thư.

Hạch gác thông thường là hạch nách nhóm I, nhưng cũng có thể là nhóm II, III, hạch vú trong hay hạch gian cơ ngực.

Vai trò của hạch bạch huyết trong phẫu thuật ung thư vú

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 09:38 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 08 Tháng 8 2016 09:46





Photo: Terese Winslow

Học viện Y học và Khoa học Quốc gia Việt Nam đã nghiên cứu và phát triển thành công kỹ thuật này, giúp bệnh nhân ung thư vú giảm thiểu rủi ro biến chứng và duy trì thẩm mỹ.



Trong quá trình phẫu thuật, bác sĩ sẽ dùng dụng cụ để dò tìm hạch bạch huyết đầu tiên nhận được chất nhuộm từ khối u. Nếu hạch này không có dấu hiệu di căn, chỉ cần loại bỏ nó là đủ. Nếu có dấu hiệu di căn, bác sĩ sẽ tiếp tục loại bỏ các hạch tiếp theo cho đến khi tìm thấy hạch có dấu hiệu di căn. Kỹ thuật này giúp giảm thiểu rủi ro biến chứng và duy trì thẩm mỹ cho bệnh nhân.