

Bs Đoàn Hoàng - Khoa Phụ Sản

Nhóm 1: Khuyến cáo về dự phòng chảy máu sau đẻ

1. Sản phẩm thu được tăng gấp 3 trong suốt giai đoạn 3 (khuyến cáo mạnh mẽ, bằng chứng chắc chắn trung bình)

2. Oxytocin (10UI, tiêm bắp/ truyền tĩnh mạch) được khuyến cáo dùng trong việc dự phòng chảy máu sau đẻ (khuyến cáo mạnh mẽ, bằng chứng chắc chắn trung bình).

3. Oxytocin không có thay thế:

- Ergometrin/ Methylergometrin được thu nhận
- Hoặc hãn hãn p Oxytocin và Ergometrin
- Hoặc Misoprostol được uống (600mcg)
- (khuyến cáo mạnh mẽ, bằng chứng chắc chắn trung bình).

4. Không có nhân viên y tế được đào tạo chuyên môn và không sản có Oxytocin: nhân viên y tế ban đầu có thể dùng Misoprostol (600mcg) để phòng ngừa chảy máu sau đẻ (khuyến cáo mạnh mẽ, bằng chứng chắc chắn trung bình).

Active Management of the Third Stage of Labor (AMTSL)

Offer to every woman...

1

Give oxytocin within 1 minute of childbirth.



2

Deliver the placenta by controlled traction on the umbilical cord and counter-pressure to the uterus.



3

Massage the uterus through the abdomen after delivery of the placenta.



!

During recovery, palpate the uterus through the abdomen every 15 minutes for two hours to make sure it is firm and monitor the amount of vaginal bleeding.

...at every birth,
by every skilled provider.




RTI International PATH EngenderHealth
International Confederation of Midwives IP-PEGO
International Federation of Gynecology and Obstetrics (FIGO)



Strategic Communication and Behavior Change for Reducing Maternal and Neonatal Mortality and Morbidity

Sử dụng các balloon đặt vào buồng tử cung



Ferrazzani: tỷ lệ thành công là 92,3%

Nhóm khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới về phòng và điều trị chảy máu sau đẻ

Mức độ	Loại bằng chứng
1a	Chứng cứ thu được từ phân tích gộp của các thử nghiệm ngẫu nhiên
1b	Chứng cứ thu được từ ít nhất một thử nghiệm ngẫu nhiên
2a	Chứng cứ thu thập từ một nghiên cứu có đối chứng được thiết kế tốt nhưng không ngẫu nhiên
2b	Chứng cứ thu được từ ít nhất một nghiên cứu bán thực nghiệm được thiết kế tốt
3	Chứng cứ thu thập từ nghiên cứu không thực nghiệm được nghiên cứu tốt, chẳng hạn như nghiên cứu so sánh, nghiên cứu tương quan và báo cáo trường hợp.
4	Chứng cứ thu thập từ các báo cáo ban chuyên gia, ý kiến hoặc kinh nghiệm lâm sàng của các tác giả đầu ngành.

Cấp độ khuyến cáo

Cấp độ	Loại khuyến cáo
A	Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng có chất lượng tốt và tính thống nhất của các khuyến cáo và bao gồm ít nhất một thử nghiệm ngẫu nhiên
B	Dựa trên các nghiên cứu lâm sàng được thực hiện tốt nhưng không có thực nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên
C	Không có các nghiên cứu lâm sàng chất lượng tốt

Bản đồ hướng dẫn 2015 recommendations for the prevention and treatment of postpartum