

Ths Bs Võ Thị Kim Cẩm - Khoa Nội TM


Suy tim phĩi có thể diễn biến trong 3-10% trường hợp suy tim, nhưng thông thường là hậu phát của suy tim trái diễn biến suy tim toàn bộ, có thể xảy ra diễn biến hoặc sau một thời gian có suy tim trái.

Trường hợp này, việc khảo sát chức năng của tim chủ yếu dựa vào các phương pháp thăm dò có xâm nhập như thông tim, chụp buồng tim. Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật trên phương diện chẩn đoán hình ảnh, siêu âm tim đã trở thành phương pháp không xâm nhập, dễ dàng, thuận lợi và rẻ tiền. Siêu âm cho phép đo được kích thước các buồng tim, thành, áp lực của các buồng tim và mạch máu liên quan một cách chính xác.

Đánh giá chức năng thất phải bằng siêu âm Doppler tim

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 04 Tháng 3 2017 18:17 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 04 Tháng 3 2017 18:28



[Đo diện tích và lưu lượng kinh nhi](#) phôi cu *i tâm thu*