

BS CK2 Nguyễn Thị Kiều Trinh - Khoa Phẫu Sản


Ung thư cổ tử cung (UTCTC) là bệnh lý ác tính của biểu mô lát (biểu mô vảy) hoặc biểu mô tuyến cổ tử cung, thường gặp ở độ tuổi 30 đến, đứng hàng thứ hai trong các ung thư sinh dục nữ giới với tỷ lệ mắc cũng như tử vong.

Nhiều mầm hoocnхи HPV typ Human Papillomavirus (HPV) nguy cơ cao đã được khám phá là nguyên nhân tiên phát của UTCTC. HPV là tác nhân truyền qua đường tình dục. Nguy cơ nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời có nguy cơ phà nay là khoảng 80%, và tỷ lệ nhiễm cao nhất xảy ra trong độ tuổi 20-30, có thể lên đến 20-25% trong quan hệ. Sau lần nhiễm HPV đầu tiên, khoảng 5-10% các trường hợp có thể hình thành các biến đổi tiền ung thư do HPV. Đôi khi cả các trường hợp nhiễm HPV sẽ không. Nếu người phụ nữ nhiễm HPV nguy cơ cao và phải hợp với các yếu tố nguy cơ khác, tên thường ban đầu có thể tăng tiến và tiến triển trong khoảng 10 - 20 năm qua các giai đoạn tân sinh nở biến đổi hình thành UTCTC xâm lấn.

Cắt nhồi dò phòng ung thư cổ tử cung

Vị trí bùi Biên tháp viên

Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 10:42 - Lần cắt nhồi cuộn Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 11:43



Cập nhật dữ phòng ung thư cổ tử cung

Vịt bòi Biên tảo viên

Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 10:42 - Lần cập nhật cuối cùng Thứ năm, 05 Tháng 7 2018 11:43

