

Ths Nguyễn Minh Tuấn - Khoa Huyết Học

ĐẠI T VẬN ĐỘNG

Đái tháo đường là một trong những rối loạn trao đổi chất đặc trưng bởi tăng đường huyết mãn tính với các rối loạn chuyển hóa béo, carbohydrate và protein mà nguyên nhân là do cơ thể thiếu hụt hoặc sản xuất không đủ insulin một cách không đúng mức đã gây nên những rối loạn mãn tính trong cơ thể.

Hiện nay bệnh đái tháo đường được chia làm 2 loại chính: đái tháo đường type 1 và type 2. Cả 2 type của bệnh đều làm cho lượng đường trong máu luôn tăng cao. Điều này gây nên những thay đổi tính chất vật lý của máu.



Đông cầm máu là biểu hiện của quá trình sinh học và sinh hóa, là sự thay đổi tình trạng vật lý của máu làm cho máu chuyển từ dạng lỏng sang dạng rắn. Sự biến chuyển này nhằm mục đích cuối cùng là hình thành một cục máu đông có tồn tại lâu dài.

Trong cơ thể luôn luôn tồn tại hai hệ thống một bên có xu hướng làm đông, một bên có xu

hormone làm đông như sự cân bằng sinh lý. Một khi sự cân bằng sinh lý này mất đi sẽ dẫn đến huyết què tặc mạch do huyết khối hoặc máu chảy kéo dài.

Bệnh nhân đái tháo đường do nồng độ glucose máu tăng cao và kéo dài đã ảnh hưởng tới sự cân bằng sinh lý gây quá trình đông máu và các chất đông máu và đây cũng là nguyên nhân dẫn đến những biến chứng ở bệnh nhân đái tháo đường. Nhận thức được tính nguy hiểm của vấn đề này chúng tôi đã chọn đề tài: **“Nghiên cứu đặc điểm rối loạn chức năng máu đông máu ở bệnh nhân đái tháo đường type 2 Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Nam”** với hai mục tiêu:

1. Nghiên cứu đặc điểm các rối loạn chức năng máu, đông máu ở bệnh nhân đái tháo đường.
2. Khảo sát mối liên quan giữa mức độ glycosyl hóa hemoglobin (HbA1c).

[Mời các bạn xem tiếp tại đây](#)