

Ths Bs Nguyễn Thị - Khoa Ngoại TH

TÓM TẮT

Đặt vấn đề: Nghiên cứu này nhằm mục đích đánh giá kết quả sử dụng thuốc nội soi đái tháo đường ở trẻ ung thư đái tháo đường tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu Gồm 07 bệnh nhân đái tháo đường chẩn đoán ung thư biểu mô tuyến đái tháo đường ở đái tháo đường phân phối thuốc nội soi từ tháng 06/2009 đến tháng 01 năm 2011 tại Khoa Ngoại Tổng hợp bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. Nghiên cứu mô tả cắt ngang, dữ liệu được phân tích bằng phương pháp mô tả và kết quả cũng như theo dõi ngắn hạn của các bệnh nhân đái tháo đường phân phối thuốc.

Kết quả: Tuổi trung bình của bệnh nhân trong nhóm nghiên cứu là 52,7 tuổi, tỷ lệ nam/nữ là 2,5. Tỷ lệ chuyển mổ là 14,3%, không có tai biến trong mổ và tỷ lệ biến chứng sau mổ là 28,6% (mất trí nhớ ngắn hạn nhẹ trung và nặng, mất trí nhớ ngắn hạn trung và nặng sau mổ). Thời gian phẫu thuật trung bình là 185 phút, thời gian nằm viện trung bình là 15,6 ngày. Với thời gian tái khám trung bình 6 tháng, không có bệnh nhân nào tử vong, chưa phát hiện tái phát tại chỗ và di căn hạch trocar.

Kết luận: Cắt đái tháo đường qua nội soi ở bệnh nhân có hỗ trợ trong ung thư đái tháo đường là kỹ thuật khó thi và an toàn tại bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 21 Tháng 2 2014 15:11 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 22 Tháng 2 2014 16:01



[Xem toàn văn tại đây](#)