

Ngộ độc cấp paracetamol (acetaminophen)

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 23 Tháng 4 2017 08:28 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 23 Tháng 4 2017 08:51

Bs Trần Vũ Kiệt - Khoa ICU

I. ĐỊNH NGHĨA:

- Paracetamol là thuốc giảm đau phổ biến nhất được sử dụng rộng rãi nhất, hiện có rất nhiều sản phẩm thuốc khác nhau.

- Ngộ độc có xu hướng tăng lên ở nước ta, đây là loại ngộ độc dễ gặp nhất trong số các bệnh cấp tính, chẩn đoán sớm và điều trị là khi bệnh nhân lạm dụng paracetamol để điều trị với mức độ quá liều lặp lại nhiều lần. Thời gian cũng là nguyên nhân hay gặp.

- Ngộ độc biểu hiện chính là viêm gan có thể dẫn tới suy gan cấp và tử vong tuy nhiên nếu được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời với liều N-acetylcystein (NAC) cũng dễ dàng cứu sống bệnh nhân.

Nguy hiểm của paracetamol (acetaminophen)

Viết bởi Biên tập viên

Đăng ngày 23 Tháng 4 2017 08:28 - Lần cập nhật cuối Đăng ngày 23 Tháng 4 2017 08:51



Nguy hiểm của paracetamol quá lớn nếu dùng quá liều. Dùng quá liều paracetamol có thể gây tổn thương gan, thậm chí dẫn đến suy gan, viêm gan, hoại tử gan, và cuối cùng là tử vong. Paracetamol là một loại thuốc giảm đau và hạ sốt phổ biến, được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, việc sử dụng quá liều hoặc sử dụng kéo dài có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng, đặc biệt là tổn thương gan. Gan là cơ quan chịu trách nhiệm chuyển hóa thuốc trong cơ thể. Khi dùng quá liều, gan phải xử lý một lượng lớn thuốc, dẫn đến tổn thương tế bào gan, viêm gan, và cuối cùng là suy gan. Các triệu chứng của tổn thương gan do paracetamol bao gồm mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, nôn, đau bụng dưới sườn phải, vàng da, và nước tiểu sẫm màu. Nếu nghi ngờ đã dùng quá liều paracetamol, cần phải đi khám ngay lập tức để được điều trị kịp thời. Việc điều trị thường bao gồm việc ngừng dùng thuốc, bù nước, và trong một số trường hợp nặng, có thể cần phải ghép gan.