

Bs Trần Lê Pháp -

1. GIỚI THIỆU

Nhiệm vụ khu vực phòng chống nhiễm HIV (NKĐTN) có tầm suýt mạt bệnh khá dao động ở các nhóm bệnh nhân có mức độ suy giảm miễn dịch khác nhau. Tình trạng suy giảm miễn dịch có thể liên quan đến:

- 1) Tình trạng hàng rào cơ học hoặc rào cản miễn dịch giảm sút;
- 2) Rối loạn hệ vi sinh bình thường và hình thành các chủng vi khuẩn kháng kháng sinh do sử dụng kháng sinh kéo dài;
- 3) Rối loạn chức năng và số lượng tế bào có thể quy định miễn dịch (ví dụ: Tế bào, tế bào lympho...).

Các bệnh nhân suy giảm miễn dịch do NKĐTN hay, và các dấu hiệu nhiễm khuẩn có thể khác biệt so với quần thể chung. Nhiệm vụ có thể phức tạp hơn do các bệnh trong bệnh viện. Một nghiên cứu tiến cứu với cỡ mẫu liên tiếp trên 200 bệnh nhân nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch (HIV) với tỷ lệ nam: nữ là 1:1,6, đến khám tại phòng khám ngoại trú của một bệnh viện ở Nigeria cho thấy tỷ lệ mắc bệnh chung là 26%, trong đó 15,8% nam và 32,3% nữ. Do có tình trạng suy giảm miễn dịch nên tầm suýt mạt bệnh NKĐTN trên bệnh nhân nhiễm HIV cao hơn so với người không nhiễm HIV, bệnh cũng thường gặp trên bệnh nhân nhiễm HIV tiến triển hơn là bệnh nhân mới nhiễm HIV.

[Xem tiếp tại đây](#)