

Bs Hs Kiện Phát -

Rút nòng khí quản (NKQ) sau phẫu thuật tuy đơn giản nhưng có nhiều nguy cơ tiềm ẩn cho người bệnh. Một kết quả từ NAP4 của Anh công bố năm 2011 cho thấy tỉ lệ biến chứng sau rút NKQ chiếm một phần ba số ca được báo cáo có liên quan tới gây mê, xảy ra ở giai đoạn thoát mê hoặc hồi tỉnh. Mặc dù tai biến xảy ra khi rút NKQ sau gây mê có tỉ lệ suất cao hơn so với rút NKQ, người bệnh hiếm khi cần đặt lại ống NKQ. Thực hành rút NKQ an toàn ngày càng được quan tâm nhiều hơn qua các nghiên cứu và hướng dẫn từ các hiệp hội GMHS trên thế giới.

Rút NKQ là động tác nguy cơ: họ có thể t thanh quản kích thích, thiếu oxy máu do mất kiểm soát đường thở, mất khả năng bảo vệ đường thở, tổn thương thanh khí phế quản, phù phổi sau tắc nghẽn. Nguyên nhân: có thể do chọn thời điểm, phù nề đường thở, tổn thương giãn cơ, tổn thương thực opioids

Hiệp hội đường thở khó (DAS), GMHS Hoa Kỳ, hiệp hội GMHS Pháp đưa ra các hướng dẫn và quy định lý đường thở để nhân viên y tế lập kế hoạch và đánh giá nguy cơ trước rút NKQ.



[Xem tiếp đây](#)