


Bs Huỳnh Minh Nhật - Khoa Nhi tiêu hóa

Viêm đại tràng giả mạc hay còn gọi là viêm đại tràng do *Clostridium difficile*. Đây là một bệnh lý đại tràng đặc biệt, hầu như chỉ gặp ở người lớn tuổi và người sử dụng kháng sinh và sử dụng thuốc hạ vi khuẩn bình thường của đường ruột gây nên sự phát triển quá mức của vi khuẩn *Clostridium difficile* (*C. difficile*), vi khuẩn này tiết ra độc tố gây tiêu chảy và viêm đại tràng giả mạc (PMC). Trong trường hợp hiếm hoi, các sinh vật khác có thể tham gia gây bệnh.



Clostridium difficile là một vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, gram dương, trực khuẩn có khả năng tạo

Viêm đại tràng giả mạc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 10:43 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 10:55

thành bào tử và bào tử được tìm thấy rộng rãi trong thiên nhiên, đặc biệt là trong môi trường nông nghiệp và các cơ sở chăm sóc dài ngày, nên mức độ phơi nhiễm kháng sinh cao.

1. Nguyên nhân

Hầu hết các loại kháng sinh nào cũng có thể gây viêm đại tràng giả mạc ngay cả những loại kháng sinh dùng để điều trị bệnh lý này. Thuốc kháng sinh phổ biến nhất liên quan gồm:

- Clindamycin, ampicillin, and cephalosporins là những kháng sinh hàng đầu liên quan đến bệnh lý này. Cephalosporins thế hệ hai, ba đặc biệt như cefotaxime, ceftriaxone, cefuroxime, and ceftazidime rất hay gặp.
- Fluoroquinolones (ciprofloxacin, levofloxacin và moxifloxacin)
- Penicillin/ β -lactamase-inhibitor kết hợp như ticarcillin/clavulanate và piperacillin/tazobactam

Các nguyên nhân khác

- Ngoài ra, những người bị bệnh ung thư, hóa trị đôi khi có thể phá hủy các vi khuẩn trong ruột và kích hoạt sự phát triển của viêm đại tràng giả mạc. Viêm đại tràng màng giả cũng có thể phát triển ở những người bị bệnh có hệ miễn dịch suy giảm như viêm loét đại tràng, bệnh Crohn.

Yếu tố nguy cơ

- Uống thuốc kháng sinh.
- Ở trong bệnh viện hoặc nhà dưỡng lão.
- Tuổi, đặc biệt là trên 65 năm.
- Có hệ thống miễn dịch suy yếu.
- Có một căn bệnh đại tràng, chẳng hạn như bệnh viêm ruột và ung thư đại trực tràng.
- Trải qua phẫu thuật đường ruột.
- Hóa trị liệu điều trị ung thư.

2. Biểu hiện lâm sàng

Viêm đại tràng giả mạc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 10:43 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 10:55

- Tiêu chảy là biểu hiện thường gặp nhất. Phân hầu như không có máu, thay đổi từ mềm, sệt đến tóe nước hay nhầy mũi vùi một mùi đặc trưng. Bệnh nhân có thể đi cầu 20 lần mỗi ngày

- Sốt 28%

- Đau bụng 22%

- Tăng bạch cầu 50%. Một dấu hiệu quan trọng bệnh nhân nghi ngờ mắc bệnh là tăng bạch cầu không rõ nguyên nhân, với ≥ 15.000 BC/ml. Nhóm bệnh nhân này có nguy cơ cao bị biến chứng do *C. difficile* nhiễm trùng, đặc biệt là phình đại tràng nhiễm độc và nhiễm trùng huyết.

3. Chẩn đoán

(1) tiêu chảy (≥ 3 phân sệt mỗi 24 h và ≥ 2 ngày) không có nguyên nhân khác được phát hiện

(2) độc tố A hoặc B được phát hiện trong phân bằng phương pháp khuếch đại polymerase (PCR) hoặc cấy, hoặc màng giả thực trong đại tràng.

Viêm đại tràng màng giả là một hình thức nhiễm khuẩn cấp tính *C. difficile*, được nhìn thấy qua nội soi khi khoảng 50% bệnh nhân tiêu chảy có cấy phân dương tính và phát hiện thấy độc tố *C. difficile*. Nội soi là công cụ chẩn đoán nhanh nhưng bệnh nhân nặng nghi ngờ bệnh VĐTGM và đau bụng cấp tính, nhưng một kết quả âm tính trong kiểm tra này không loại trừ nhiễm *C. difficile*.

Viêm đại tràng giả mạc

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 10:43 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 17 Tháng 2 2017 10:55

