

Bs Trần Quốc Chí n - Trưởng khoa ung bướu

PHẦN IX

CÁC TÁC NHÂN HÓA TRỞ THAY TH

Docetaxel (taxotere) là một hợp chất bán tổng hợp có cấu trúc liên quan với paclitaxel. Đặc tính của docetaxel xảy ra theo nhiều kiểu giống với paclitaxel. Tuy nhiên, việc dùng thuốc kéo dài với docetaxel làm tăng độc tính da và tạo ra tình trạng phù có ý nghĩa. Một thử nghiệm rút gọn đây Châu Âu đã kết luận rằng docetaxel có thể thay thế cho paclitaxel. Thử nghiệm số 1077 bệnh nhân ung thư biểu mô buồng trứng giai đoạn FIGO IC đến IV được phân ngẫu nhiên hoặc paclitaxel và carboplatin hoặc docetaxel và carboplatin; thời gian theo dõi trung bình bệnh nhân còn đang sống là 21 tháng. Sống thêm không tiến triển trung bình và sống thêm toàn bộ (tại thời điểm 18 tháng) cho bệnh nhân được dùng thuốc với docetaxel và carboplatin là 15.4 tháng và 76.6%, lần lượt theo thứ tự. Sự khác nhau về đặc tính dùng thuốc chính giữa hai nhánh là đặc tính thần kinh (thường gặp hơn với paclitaxel kết hợp) và các chất tiêu xương (thường gặp hơn với docetaxel kết hợp). Đặc tính thần kinh ít hơn có ý nghĩa thống kê sau dùng thuốc kết hợp với docetaxel được chứng minh vẫn còn rõ rệt tại thời điểm 10 tháng. Các thông số về chất lượng cuộc sống toàn bộ có thể so sánh được ở hai nhánh. Tuy nhiên, các triệu chứng về khớp/cổ ít hơn có ý nghĩa trong thời gian dùng thuốc docetaxel kết hợp là 33% so với paclitaxel kết hợp là 48%, cũng như triệu chứng yếu chân và tay với docetaxel kết hợp là 33.9% , ngược lại với paclitaxel kết hợp là 47.7%. Các tác giả đã kết luận rằng docetaxel kết hợp được chứng minh có thể thay thế cho paclitaxel kết hợp như là hóa trị bậc một trong ung thư biểu mô buồng trứng bởi do chất sống dùng thuốc được cải thiện trong khi vẫn giữ được hiệu quả giống như vậy.

