


Bs Huỳnh Minh Nhật - Khoa Nội tiêu hóa

Nhiễm *Helicobacter pylori* (*H. pylori*) là một trong những nhiễm khuẩn mạn tính thông thường gặp nhất ở người. Tỷ lệ suất nhiễm *H. pylori* thay đổi tùy theo tuổi, tình trạng kinh tế và chế độ ăn. Các tính có khả năng hãm nã dân số trên thế giới nhiễm vi khuẩn này. Các nước đang phát triển như Việt Nam tỷ lệ suất nhiễm lên tới hơn 70% và xu hướng giảm dần ở trẻ em 1-2 tuổi.

Ủy ban quốc tế về nghiên cứu Ung thư - IARC (thuộc tổ chức Y tế thế giới -WHO) đã xếp *H. pylori* làm tác nhân gây ung thư nhóm 1 vào năm 1994 và đã xác nhận lại trong năm 2009. Khoảng 78% trong số tất cả các trường hợp ung thư dạ dày các tính là do nhiễm *H. pylori* mạn tính. Cho đến nay có đủ dữ liệu từ các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên và hiệu quả điều trị nhiễm *H. pylori* giúp giảm nguy cơ ung thư dạ dày.



Phòng ngừa ung thư dạ dày bằng diệt trừ *Helicobacter Pylori*

Viết bởi Biên tập viên

Thủ bài, 20 Tháng 1 2018 12:27 - Lần cập nhật cuối: Chủ nhật, 21 Tháng 1 2018 05:50

[Xem tiếp tại đây](#)