

Bs Trần Vũ Kiệt - ICU

I. Định nghĩa

Thay huyết tương (Plasma exchange – PEX) là phương pháp loại bỏ các kháng thể tự miễn có trong bệnh lý Guillain-Barre' ra khỏi cơ thể cùng với huyết tương và được thay thế bằng huyết tương mới. Do đó làm cải thiện tình trạng yếu cơ và giúp cho bệnh nhân (bn) được hồi phục nhanh chóng.

II. Chỉ định

HC Guillain-Barré trong giai đoạn tiến triển cấp tính. PEX càng sớm càng tốt. Thời gian giữa các lần PEX (cách ngày), số lần PEX (trung bình 4 – 6 lần) tùy theo đáp ứng của bn.

Bn có tiến triển sốc phản vệ với huyết tương

III. Chỉ định chỉ định

Thận trọng trong một số trường hợp sau:

- Bn đang hấp thụ áp: phải nâng huyết áp và giá trị bình thường của bn trước khi tiến hành thủ thuật
- Bn đang có rối loạn đông máu: cần chú ý trong quá trình đặt catheter tĩnh mạch (TM) để PEX.

Qui trình thay huyết thanh trong điều trị hội chứng Guillain Barre bằng dịch thay thế albumin 5%.

Viết bởi Biên tập viên

Chợ nhớt, 18 Tháng 3 2018 15:33 - Lợn cắp nhớt cuối Thị hai, 19 Tháng 3 2018 07:51

