

Bs. Đặng Thị Quỳnh Chi – Khoa Nội thận – nội tiết

Trong nhiều năm, đái tháo đường thai kỳ (ĐTĐTK) được định nghĩa là bất kỳ số bất dung nạp glucose máu nào được phát hiện lần đầu tiên trong thời kỳ mang thai, bất kỳ tình trạng này có thể xảy ra trước khi mang thai hay muộn hơn sau khi mang thai. Định nghĩa này tạo điều kiện hình thành một chỉ định lâm sàng nhất để phát hiện và phân loại ĐTĐTK, nhưng nó lại bỏ sót nhiều bệnh nhân bị sai lệch chính xác.

Bệnh béo phì và đái tháo đường đang ngày càng gia tăng đã dẫn đến sự gia tăng đái tháo đường týp 2 ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cùng với đó là sự gia tăng số lượng phụ nữ mang thai chưa được chẩn đoán đái tháo đường týp 2. Do số lượng lớn phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường týp 2 không được chẩn đoán nên cần kiểm tra sàng lọc những phụ nữ có yếu tố nguy cơ mắc đái tháo đường týp 2.



[Xem toàn bộ tại đây](#)

Béo phì và đái tháo đường đang ngày càng gia tăng đã dẫn đến sự gia tăng đái tháo đường type 2 ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, cùng với đó là sự gia tăng số lượng phụ nữ mang thai chớm có chẩn đoán đái tháo đường type 2. Do số lượng lớn phụ nữ mang thai mắc đái tháo đường type 2 không được chẩn đoán nên cần kiểm tra sàng lọc những phụ nữ có yếu tố nguy cơ mắc đái tháo đường.