

Bs Nguy n Văn Th c - Khoa Ngo i l ng ng c ti t ni u

1. T ng quan


Sinh thi t tuyen ti n li t (TTL) đ c đ t ra đ a trên m c đ PSA và khám tr c tràng b ng tay nghi ng . Tu i, các b nh lý ti m tàng, và k t qu các li u pháp đ u tr c ũng ph i đ c xem xét và th o lu n tr c khi th c hi n. Phân t ng nguy c là công c giúp gi m các tr ng h p sinh thi t không c n thi t.

M c tăng PSA đ n đ c không ph i g i ý sinh thi t ngay. Ph i ki m tra PSA sau m t vài tu n s đ ng cùng m t xét nghi m đ i các đ u ki n tiêu chu n(t c là không xu t tinh, khám tr c tràng b ng tay, nghi m khu n ni u) c ũng m t phòng xét nghi m. Đ u tr kháng sinh theo kinh nghi m b nh nhân không có tri u ch ng đ gi m PSA xu ng th p không nên đ c th c hi n

Sinh thiết tuyến tiền liệt

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 08:11 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 01 Tháng 6 2018 09:49



Kỹ thuật sinh thiết tiền liệt tuyến dưới hướng dẫn siêu âm

Phẫu thuật nội soi tuyến tiền liệt là một kỹ thuật mới, được áp dụng rộng rãi trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt. Kỹ thuật này có ưu điểm là ít xâm lấn, giảm đau, và có thể áp dụng cho các bệnh nhân có các bệnh nền khác. Tuy nhiên, kỹ thuật này vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là về độ chính xác và khả năng phát hiện các tổn thương nhỏ. Do đó, việc lựa chọn kỹ thuật điều trị cần dựa trên các yếu tố lâm sàng và sinh thiết.

Tài liệu tham khảo: European Urology Guidelines 2017.