

Bs Phạm Văn Thanh - Khoa GMPT

I. Lịch sử :

- Năm 1848 James Simpson là người đầu tiên báo cáo triệu chứng hấp (cas) tở vong do gây mê, bệnh nhân chết do hít phải nước và rượu u mê nhưng không phải do tác động phụ của chloroform.

- Năm 1940 số n khoa báo cáo 15 cas (14 cas xuất hiện trên số n ph dùng thuốc mê bệc h i trong lúc sanh ng âm đ o hay m i y thai và có 5 cas tở vong.).

- Curtis Lester Mendelson báo cáo về “Hít các thành phần d dày vào phổi trong gây mê Số n khoa” trên tạp chí Số n ph khoa M 1946.

Hội chứng Mendelson

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:31 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:48




Đặc trưng của hội chứng này là tình trạng viêm phổi do hít phải dịch dạ dày, thường xảy ra trong quá trình hồi sức cấp cứu sau ngừng tim. Hội chứng này có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Các triệu chứng thường gặp bao gồm ho, sốt, khó thở, và đau ngực. Việc chẩn đoán dựa trên tiền sử lâm sàng và các xét nghiệm cận lâm sàng. Điều trị chủ yếu là hỗ trợ hô hấp và điều trị viêm phổi.

Hội chứng Mendelson

Vết bìa Biên tập viên

Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:31 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 28 Tháng 8 2018 16:48



with a PaO₂ of 60 mm Hg. PaCO₂ tăng có thể có thể tăng hóa. <https://patient.info/doctor/mendelsons-syndrome>