


## **Bs Lê Văn Tuấn - Khoa ICU**

Nền tảng chính để đưa trở lại huyết động sự nhầm lẫn là hội chứng truy cập, sau đó là thuốc vận mạch sau khi truy cập không được điều chỉnh huyết áp mục tiêu. Norepinephrine, một catecholamine, là thuốc vận mạch đầu tiên được sử dụng trên toàn thế giới vì hiệu quả do tất cả các catecholamine được sử dụng thông qua xuyên thấu vào cùng một thụ thể adrenergic, nhưng bác sĩ lâm sàng có thể thêm thuốc chống co thắt do catecholamine. Tuy nhiên, thời điểm can thiệp bổ sung này là khác nhau. Quy trình điều trị này dựa trên ba yếu tố chính: tính sẵn có, sự quen thuộc và hiệu quả an toàn. Theo chúng tôi, cần xem xét thêm về đáp ứng thuốc vận mạch tiềm năng vì sau khi hội chứng tích thích hợp, đáp ứng với các loại thuốc vận mạch khác nhau là không đồng nhất cũng không thể đoán trước. Bệnh nhân bị bệnh nặng không đáp ứng với catecholamine liều cao có kết quả xấu. Thông tin như vậy, bệnh nhân có phân loại khác nhau với các tác nhân không phải catecholamine bao gồm vasopressin và angiotensin II: nhưng khi bệnh nhân bị hạ huyết áp phân loại huyết áp thì kết quả điều trị cũng khác nhau. Khả năng đáp ứng bệnh nhân này với thuốc vận mạch thông tin như phân loại pháp lâm sàng và độ nhạy chống vi khuẩn. Trong bài bình luận này, các tác giả đưa ra khái niệm về thuốc vận mạch phản ứng rõ ràng rằng trong đó bệnh nhân bị sự nhầm lẫn được bắt đầu trên nhu cầu thuốc vận mạch với các chế độ khác nhau để thông tin đánh giá độ nhạy của thuốc vận mạch. Một khi độ nhạy của thuốc vận mạch được đánh giá, thì thuốc vận mạch sẽ được "giảm xuống" theo đó.

## Hour-1 Bundle

### Initial Resuscitation for Sepsis and Septic Shock

Surviving Sepsis Campaign



© 2016 the Society of Critical Care Medicine and the European Society of Intensive Care Medicine. All Rights Reserved.

Society of  
Critical Care Medicine  
The American College of Surgeons

ESICM  
European Society of Intensive Care Medicine

Đã được đăng tải trên trang web của Bộ Y tế Việt Nam và các cơ quan y tế khác. Mọi vi phạm bản quyền sẽ bị xử lý theo pháp luật.

# Thuốc và n mô ch ph r ng: m t cách ti p c n m i đ đ u tr ban đ u s c nhi m trùng?

Vi t b i Biên t p viên


Th năm, 18 Tháng 4 2019 10:01 - L n c p nh t cu i Th năm, 18 Tháng 4 2019 10:26

|                                            | Vasopressin [ 14 ]              |                                        |              | Angiotensin II [ 6 ]              |                                         |              |
|--------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
|                                            | Trả lời<br>45%<br>( n =<br>426) | Không<br>phản hồi<br>55% ( n =<br>512) | Giá<br>trị P | Trả lời<br>69,9%<br>( n =<br>114) | Không<br>phản hồi<br>30,1%<br>( n = 49) | Giá<br>trị P |
| Tỷ lệ tử vong ở<br>bệnh nhân (%)           | 56,6%                           | 71,7%                                  | <0,001       | 35%                               | 71%                                     | <0,0001      |
| Liều<br>catecholamine<br>(mcg / kg / phút) | 0,35 ±<br>0,25                  | 0,33 ± 0,27                            | 0,18         | 0,32 ±<br>0,32                    | 0,53 ± 0,39                             | 0,0002       |
| MAP (mmHg)                                 | 69 ± 12                         | 65 ± 12                                | <0,001       | 67,1 ±<br>5,21                    | 64,8 ± 5,02                             | 0,0087       |
| Steroid (%)                                | 58,9                            | 62,5                                   | 0,26         | 55,3                              | 57,1                                    | 0,8647       |
| Lactate (mmol/L)                           | 4,0 ± 3,6                       | 5,4 ± 4,8                              | <0,001       | 3,43 ±<br>2,43                    | 5,80 ± 6,01                             | 0,013        |
| Điểm SOFA                                  | 13 ± 4                          | 12 ± 3                                 | 0,49         | 11,65 ±<br>2,78                   | 12,06 ±<br>2,99                         | 0,4313       |
| Tuổi                                       | 62 ± 14                         | 61 ± 15                                | 0,17         | 61,7 ±<br>15,32                   | 63,1 ±<br>16,33                         | 0,478        |

## Thuốc viên mỗch phở rởng: mỗt cách tởp cởn mỗi đở đở u trở ban đở u sỏc nhiỏm trùng?

Viỏt bởi Biẻn tởp viẻn

Thỏ năm, 18 Thỏng 4 2019 10:01 - Lỏn cởp nhỏt cuỏi Thỏ năm, 18 Thỏng 4 2019 10:26



Thỏ năm, 18 Thỏng 4 2019 10:01 - Lỏn cởp nhỏt cuỏi Thỏ năm, 18 Thỏng 4 2019 10:26