

BS. Nguyễn Thành Tín -

Trào ngược dạ dày thắc quản là bệnh thường gặp trong quá trình mang thai. Do sự thay đổi về cấu trúc và chức năng của các rào cản sinh lý bình thường để bảo vệ dạ dày trào ngược các chất trong dạ dày vào thắc quản, gây ra cảm giác đau bụng dữ dội. Điều này có thể không mang thai. Điều gì đã xảy ra với bà bầu, thay đổi lối sống là có thể không điều kiềm soát các triệu chứng mà cần phải dùng thuốc. Việc quản lý tốt u chuỗi trào ngược bà bầu mang thai đòi hỏi sự quan tâm và chuyên môn đặc biệt, vì số an toàn của người mẹ, thai nhi và trẻ sơ sinh vẫn là trọng tâm hàng đầu. Bác sĩ tiêu hóa và bác sĩ sản khoa nên làm việc cùng nhau điều trị u hóa việc điều trị. Việc bắt đầu số đông các loại thuốc phòng ngừa sau khi tháo lụn côn trùng vẫn rõ ràng và lợi ích với bà bầu. Nhưng bà bầu không có tiền sử trào ngược, các triệu chứng thường xuyên sau khi sinh.

I. Giới thiệu:

Các triệu chứng tiêu hóa là một trong những vấn đề thường gặp nhất khi mang thai. Một số phản ứng bao gồm loét tiêu hóa chủ khi mang thai và những phản ứng mang thai khác có biến đổi rõ rệt. Mang thai làm thay đổi giải phẫu của các cơ quan gây ra những đột biến bình thường của thai quản, dẫn đến dày và rụt. Bệnh trào ngược dạ dày thắc quản (GERD) thường đặc trưng là chướng bụng, đặc biệt báo cáo bao gồm 40% - 85% phản ứng trong thai kỳ mang thai. -1,2 GERD xảy ra khi số lần chuyển dạ các chất trong dạ dày vào thắc quản gây ra các triệu chứng hoặc làm tăng thường niêm mạc. Ngoài axit dạ dày, axit mật và các enzym tiêu hóa như pepsin cũng phá vỡ tính toàn vẹn của niêm mạc hoặc gây ra loét cholecystitis.

Sự thay đổi về thời điểm GERD đặc biệt báo cáo trong thai kỳ có thể là do thay đổi nội tiết tố và tăng nghĩa bao. Marrero và cộng sự đã nghiên cứu 607 phụ nữ trong các giai đoạn khác nhau của thai kỳ thông qua bảng câu hỏi và nhận xét có nguy cơ bao gồm chửa khi tuổi thai ngày càng tăng, số xuất hiện của chướng bụng chửa trước khi sinh và thai kỳ sinh đẻ, nhưng không phải do chướng bụng. Các triệu chứng chửa đầu tiên đặc biệt báo cáo là xảy ra trong ba tháng đầu khoảng 50% trào ngược họng, trong ba tháng giữa từ 20% - 40% và trong kỳ cuối của thai kỳ là 10%.

Bản trào ngược dạ dày thực quản trong thai kỳ

Vịt bòi Biên pháp viên

Thứ ba, 14 Tháng 9 2021 21:00 - Lần cấp nhứt cuối Thứ ba, 14 Tháng 9 2021 21:07

