


Bs. Nguyễn Quốc Việt -

I. TỔNG QUAN

Xạ trị vùng chậu là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí trị liệu để điều trị ung thư vùng chậu, ung thư tuyến tiền liệt, ung thư cổ tử cung, ung thư trực tràng hoặc ung thư bàng quang. Nhờ các tiến bộ trong kỹ thuật xạ trị, chẳng hạn như xạ trị điều biến cường độ (IMRT), xạ trị lập thể và xạ trị áp sát dựa trên hình ảnh, đã giúp cung cấp liều ngày càng hiệu quả với liều độc hại thấp hơn cho các mô lành. Tuy nhiên, bàng quang là cơ quan quan trọng có thể chịu ảnh hưởng từ liều xạ trị phóng xạ thấp. Mặc dù các kỹ thuật đã được cải thiện, chiếu xạ vùng chậu vẫn là nguyên nhân gây ra các tác động phụ cấp tính hoặc muộn như viêm bàng quang do chiếu xạ. Do đó, thuật ngữ “viêm bàng quang do chiếu xạ” bao gồm tất cả các tổn thương và triệu chứng của bàng quang sau khi chiếu xạ các cơ quan vùng chậu. Mặc dù nghiêm trọng của nó liên quan đến liều xạ trị tiếp xúc và bậc xạ, tổn thương từ cấp độ nhẹ cũng như lịch trình và phân bố liều được thu hẹp. Bệnh chuyển từ giai đoạn này có thể ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của bệnh nhân. Khi khả năng sống sót của bệnh nhân ung thư được cải thiện, các vấn đề về khả năng sống sót lâu dài có tầm quan trọng ngày càng tăng và sự hiểu biết về các tiến bộ và cách xử lý viêm bàng quang do bậc xạ là điều cần thiết.



Viêm bàng quang xu t huy t sau x tr vùng ch u

Vi t b i Biên t p viên

Th năm, 18 Tháng 1 2024 15:55 -

---

[Xem ti p t i đây](#)