

**Trần Văn Thành, Đặng Quốc Trung, Nguyễn Thị, Thuyết Châu Quý, Nguyễn Xuân Văn
Khoa Ngoại Tổng hợp**

TÓM TẮT

Mục tiêu: Đánh giá tính khả thi kỹ thuật nội soi sau phúc mạc hai trocar để u trệ sỏi niệu quản đơn hồng huyết.

Đặt vấn đề và phương pháp nghiên cứu: báo cáo bệnh bệnh nhân được mổ nội soi sau phúc mạc hai trocar lấy sỏi niệu quản đơn hồng huyết từ tháng 3 đến tháng 4 năm 2012. Chúng tôi sử dụng hai trocar, một cho ống kính soi và một trocar thao tác. Đánh giá kết quả trong thời gian hậu phẫu

Kết quả: Thời gian mổ trung bình 67,5 phút. Lượng máu mất không đáng kể. Thời gian nằm viện trung bình 5,8 ngày. Thời gian rút ống dẫn lưu trung bình 4 ngày. Không có biến chứng trong và sau mổ. Không có bệnh nhân nào cần dùng thuốc giảm đau sau mổ.

Kết luận: Phẫu thuật nội soi sau phúc mạc hai trocar lấy sỏi niệu quản đơn hồng huyết là khả thi mà chưa thấy làm tăng các biến chứng.

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 08 Tháng 1 2013 09:10 - Lần cập nhật cuối Thứ sáu, 11 Tháng 1 2013 09:21



[Mời các bệnh nhân xem chi tiết tại đây](#)