Khoa Ngo□i l□ng ng□c ti□t ni□u

1. Đ□I C□□NG:

Priapism là m□t tình tr□ng c□□ng c□ng d□□ng v□t không t□ ch□, kéo dài, không liên quan đ□n kích thích tình d□c và không đ□□c gi□i phóng b□ng cách xu□t tinh. Tình tr□ng này là m□t tr□□ng h□p c□p c□u v□ m□t ti□t ni□u và c□n can thi□p s□m cho đ□ ph□c h□i ch□c năng t□t nh□t.

2. TRI□U CH□NG:

1. Priapism l□u l□□ng th□p:

Th□□ng g□p nh□t, tri□u ch□ng chính là đau đ□n, m□c dù tình tr□ng này bi□n m□t khi priapism kéo dài. Đ□c đi□m c□a priapism l□u l□□ng th□p:

- S□ c□□ng c□ng □ v□t hang và m□m □ quy đ□u

- Thi□u máu c□c b□: máu hút ra t□ v□t hang có màu đen, khi làm khí máu v□t hang thì PO-2 <30 mmHg, PCO2 >60 mmHg, pH< 7,25

- Không có b□ng ch□ng v□ ch□n th□□ng.

Nguyên nhân th□□ng g□p:

- Thi□u máu h□ng c□u hình li□m, b□nh b□ch c□u.

- Thu□c ch□ng tr□m c□m (Fluoxetin, Bupropion), thu□c đi□u tr□ r□i lo□n c□□ng d□□ng (Viagra), thu□c tiêm vào d□□ng v□t đi□u tr□ c□□ng d□□ng (Papaverin), thu□c đi□u tr□ r□i lo□n tâm th□n (Olanzapin, Risperidon), s□ d□ng cocain.

- Ch□n th□□ng t□y s□ng, ung th□ di căn xu□ng d□□ng v□t.

- Vô căn.

2. L□u l□□ng máu cao:

Hi□m g□p, không đau đ□n, đ□c đi□m:

- V□t hang và quy đ□u đ□u c□□ng c□ng

- Máu hút ra t□ v□t hang đ□ t□□i.

- Có b□ng ch□ng v□ ch□n th□□ng: ch□n th□□ng d□□ng v□t, đáy ch□u.

3. ĐI□U TR□:

1. Priapism l□u l□□ng máu th□p:

- Tiêm Etilefrine tr□c ti□p ho□c Neo-Synephryn pha loãng vào v□t hang, có th□ l□p l□i.

- Rút máu t□ v□t hang, t□□t r□a b□ng n□□c mu□i.

- Khi đi□u tr□ n□i khoa th□t b□i, ph□u thu□t c□p c□u t□o c□u n□i v□t hang và th□ x□p

2. Priapism l□u l□□ng máu cao:

- Th□□ng t□ kh□i không c□n đi□u tr□.

- T□c l□ rò đ□ng tĩnh m□ch b□ng c□c máu đông t□ phát, gelatin, ho□c hóa ch□t