

Bs Trần Quốc Chí - Khoa Ung bướu

Dịch từ: The Washington Manual of Oncology, Third Edition

PHẦN I

I. Khái quát

A. Dịch tễ học

Các nước đã phát triển, ung thư vú là bệnh lý ác tính đứng đầu trong chẩn đoán thường gặp nhất ở phụ nữ và là nguyên nhân gây chết do ung thư đứng hàng thứ hai. Trong năm 2013, số ca ung thư vú mới ở Hoa Kỳ được ước tính là 232.340 và số ca tử vong là 39.620. Phân tích dữ liệu SEER (Surveillance, Epidemiology, and End Result) đã cho thấy rằng tỉ lệ tử vong do ung thư vú là hằng định từ năm 1973 đến 1980. Trong các năm đầu 1980, tỉ lệ tử vong đã tăng lên một cách nhanh chóng bởi do việc gia tăng phát hiện ung thư vú bằng sàng lọc với nhũ ảnh. Gần đây hơn, từ năm 2006 đến 2010, tỉ lệ tử vong do ung thư vú đã sụt giảm 2.3%. Tỷ lệ tử vong toàn bộ của ung thư vú đã đang sụt giảm trung bình 1.9% mỗi năm trên 10 năm qua do việc sàng lọc và điều trị bệnh tốt hơn.

Ung th^o vú (p.1)

Vi^ot b^oi Biên t^op viên

Ch^o nh^ot, 04 Tháng 8 2019 08:09 - L^on c^op nh^ot cu^oi Ch^o nh^ot, 04 Tháng 8 2019 08:21

