

Cách pha dung dịch morphine liều nh

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 29 Tháng 11 2015 20:04 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 29 Tháng 11 2015 20:31

ĐD Đ Th Trúc Linh - Khoa Ung B u

I/ Mục đích:

- Khi bắt đầu dùng morphine ta nên khởi đầu với liều thấp và dò liều tiếp cho bệnh nhân.
- Chính vì vậy ta nên pha dung dịch morphin liều nh để có thể dùng dịch morphine liều thấp hơn dùng bào chế sẵn có để dễ theo dõi và thu nhận lại cho Điều dưỡng và bệnh nhân- gia đình.
- Điều dưỡng dùng: dùng theo điều dưỡng uống, điều dưỡng tiêm thì tiêm dưới da, tiêm tĩnh mạch (không dùng điều dưỡng tiêm bắp)

II/ Các dạng morphine hiện có:

- Viên nang morphine 30mg (Morphine sulfate)
- Dung dịch tiêm morphine 10mg (Morphine chlohydrate)

Chợ nhớt, 29 Tháng 11 2015 20:04 - Lợn cắp nhớt cuối chợ nhớt, 29 Tháng 11 2015 20:31



II/ Cách in và nhả dụng cụ in y, có dán nhãn (bên dưới)

2. Quy định phân loại thuốc: 30mg x 26 vỉ x 5 vỉ x 30ml

Đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, ngày 12/01/2021.