

Bs Trần Vũ Kiệt - ICU

I. ĐỐI CƯỢNG:

1. Định nghĩa

Là bệnh tử muộn thần kinh cấp gây ra yếu và mất thay đổi trong ngày cấp cứu. Do các kháng thể qua trung gian miễn dịch gây giảm số lượng của thụ thể acetylcholine chèn nặng màng tiếp hợp thần kinh cấp (màng sau sinap).

Bệnh nhân nhồi máu (thông thường bệnh nhân có u tuyến ức) có thể tạo ra kháng thể kháng receptor acetylcholine làm giảm receptor acetylcholine chèn nặng màng sau sinap dẫn đến số vận động cấp cứu vận yếu, các cơ vận động nhồi máu có xu hướng yếu nhanh đặc biệt là cơ hô hấp dẫn đến suy hô hấp nặng cần phải thông khí nhân tạo, số yếu có tính chất tái phát nếu không loại bỏ được căn nguyên u tuyến ức.

Các biện pháp điều trị tích cực làm giảm lượng kháng thể miễn dịch trong máu đặc biệt thì nên được tình trạng lâm sàng bao gồm: dùng thuốc ức chế miễn dịch làm giảm số sinh ra kháng thể, lọc huyết tương để loại bỏ kháng thể miễn dịch ra khỏi cơ thể.

