

## **Bs CK2 Lê Thị Đĩnh -**

### **2.8. ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG**

#### **2.8.1. Các thuốc điều trị đái tháo đường**

Gồm các thuốc có cấu trúc giống ADH để kích thích, xít mũi và các loại thuốc uống.

##### **2.8.1.1. Các loại thuốc uống có cấu trúc giống AVP**


#### **Demopressine (DDAVP)**

- Biệt danh: Minirin
- Trình bày: Thuốc được trình bày dưới 3 dạng: dạng xịt mũi (lọ chứa 2,5ml); dạng uống (viên 0,1mg); Dạng chích (dung 4µg/ml). Bảo quản ở nhiệt độ +2 đến +8°C.
- Chỉ định: Đây là thuốc được chọn lựa đầu tiên trong điều trị bệnh đái tháo đường trung ương. Riêng dạng chích chỉ dành cho bệnh nhân đái tháo đường trung ương nặng bệnh nhân không thể dùng dạng xịt do khó chịu hoặc đái tháo đường sau phẫu thuật thần kinh hoặc sau chấn thương.

## Bệnh đái tháo nhạt (p.2)

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 19 Tháng 1 2020 09:36 - Lần cập nhật cuối Chỉnh sửa, 19 Tháng 1 2020 09:42



[Xem tiếp tại đây](#)