

Bs Lê Văn Tuấn -

Đây là m t b n tóm t t nhanh c a các h ng d n mà không phân tích ho c bình lu n. Đ bi t thêm thông tin, hãy truy c p tr c ti p vào h ng d n b ng cách nh p vào liên k t trong tài li u tham kh o.

Vào tháng 2 năm 2020, m t h i th o t Hi p h i Y h c Chăm sóc tích c c đã công b các h ng d n đi u tr th c hành lâm sàng v suy gan c p tính và đ t c p suy gan m n tính ng i tr ng thành, nh đã g p trong phòng chăm sóc đ c bi t (ICU) [1]

Drugs & Diseases > Medscape > Clinical Practice Guidelines

Liver Failure Management in the ICU: Clinical Practice Guidelines (2020)

Society of Critical Care Medicine

This is a quick summary of the guidelines without analysis or commentary. For more information, go directly to the guidelines by clicking the link in the reference.

February 28, 2020

 Read Comments     

- Đ i v i b nh nhân suy gan c p tính (ALF) ho c đ t c p suy gan m n (ACLF), d ch tình b t hydroxyethyl không đ c khuy n cáo cho h i s c truy n d ch ban đ u.
- M c tiêu huy t áp đ ng m ch trung bình (MAP) là 65 mm Hg, v i đánh giá đ ng th i t i máu, đ c đ xu t cho b nh nhân m c ALF ho c ACLF.
- i nh ng b nh nhân m c ALF ho c ACLF có tình tr ng h huy t áp, h i s c truy n d ch không v bình th ng đ c thì norepinephrine đ c khuy n dùng nh m t thu c v n m ch đ u tiên. Thu c này cũng đ c khuy n cáo trong các tr ng h p ALF ho c ACLF đ c đánh d u b ng h huy t áp n ng và gi m t i máu mô, ngay c khi quá trình h i s c truy n d ch đang đi n ra.

- Bệnh nhân nhân bản bệnh nghiêm trọng với ALF hoặc ACLF đang trải qua các thủ thuật xâm lấn, xét nghiệm (INR), tiểu cầu và fibrinogen, để đánh giá nguy cơ chảy máu.
- Trong thời gian chờ ghép gan, có thể khuyến nghị điều trị hỗ trợ chức năng gan phổi bao gồm chăm sóc hỗ trợ sự sống oxy bổ sung.
- Khi hỗ trợ chức năng gan thận tiến triển ở bệnh nhân nhân nguy kịch với ACLF, nên sử dụng thuốc vận mạch.
- Bệnh nhân nhân bản ALF hoặc ACLF, nên sử dụng mức tiêu thụ oxy trong huyết thanh là 110-180 mg / dL.
- Khuyến cáo rằng bệnh nhân nhân bản ALF hoặc ACLF nên được sàng lọc các nguyên nhân gây suy gan do thuốc, virus và các nguyên nhân khác để loại bỏ thuốc độc hại chức năng gan hoặc ngừng là nguồn gốc của ALF hoặc ACLF.
- Đối với các thuốc điều trị chuyển hóa gan, nên điều chỉnh liều ở bệnh nhân nhân bản ALF hoặc ACLF, với các điều chỉnh liều dựa trên chức năng thận theo chức năng gan còn lại của bệnh nhân và sử dụng tài liệu hỗ trợ tính toán có. Nên tham khảo với dược sĩ lâm sàng, nếu có.

Nguồn <https://reference.medscape.com/viewarticle/925736>

Tài liệu tham khảo:

1. Nanchal R, Subramanian R, Karvellas CJ, et al. Guidelines for the management of adult acute and acute-on-chronic liver failure in the ICU: cardiovascular, endocrine, hematologic, pulmonary, and renal considerations. Crit Care Med. 2020 Mar;48(3):e173-91. https://journals.lww.com/ccmjournal/FullText/2020/03000/Guidelines_for_the_Management_of_Adult_Acute_and.29.aspx