

BS H^o Huy Hùng -

S^ố I^{ss}u^e c

Sorafenib đã được chứng minh là có hiệu quả trong việc sống sót của bệnh nhân mắc ung thư biểu mô tế bào gan giai đoạn tiến triển (HCC), tuy nhiên, có thể rất khó dung nạp khi dùng liều cao. Mục đích của nghiên cứu này là để xác định liều tối ưu của Sorafenib và chứng minh rằng có thể sống sót lâu hơn hay không.

Phương pháp

Bệnh nhân được điều trị bằng sorafenib cho HCC từ tháng 1 năm 2008 đến tháng 7 năm 2016 tại một số bệnh viện của Canada. Điểm cuối chính là khả năng sống còn toàn bộ (OS) của bệnh nhân bắt đầu sử dụng Sorafenib liều duy nhất so với khi giảm liều.

Kết quả

Trong số 681 bệnh nhân, sorafenib được bắt đầu cho 289 bệnh nhân (42%). Thời gian sống thêm trung bình khi bắt đầu dùng liều cao và giảm liều lần lượt là 9,4 tháng và 8,9 tháng ($P = 0,15$). Sau khi điều chỉnh các yếu tố gây nhiễu tiềm ẩn, không có sự khác biệt về thời gian sống sót (HR 0,8, 95% CI 0,61-1,06, $P = 0,12$). Gần một nửa số bệnh nhân (45%) nhận được chứng minh rằng liều <50%. Thời gian sống thêm trung bình đối với chứng minh rằng liều trung bình > 75%, 50% - 75% và <50% lần lượt là 9,5 tháng, 12,9 tháng và 7,1 tháng ($P = 0,005$). Liều cao (HR 1,16, 95% CI 0,93-1,44, $P = 0,180$) và chứng minh rằng liều trung bình không liên quan đến thời gian sống sót.



Sorafenib tablet

[Xem tiếp tại đây](#)