

Bs Nguy n Th Thùy Duyên -

I. T NG QUAN:

Viêm thân s ng đĩa đ m nhi m khu n là t n th ng t i thân s ng đĩa đ m gây nên b i vi trùng không do lao.

Đ tu i th ng g p: trung niên kho ng 40-80 tu i, nam > n .

B nh r t th ng g p c các đ i t ng có suy gi m mi n đ ch nh dùng corticoid kéo dài, đái tháo đ ng, nhi m HIV.

Y u t thu n l i là nhi m khu n do các th thu t t i vùng c t s ng nh tiêm c nh c t s ng, tiêm kh p liên m m gai, ch c hút sinh thi t, đ ciment t i đ t s ng, n i soi vùng ti t ni u sinh d c...


V trí t n th ng hay g p đ n c t s ng th t l ng. Viêm thân s ng đĩa đ m nhi m khu n di n bi n nhanh, đ đ i, c p tính h n còn viêm đĩa đ m do lao di n bi n dai d ng t t .

II. NGUYÊN NHÂN:

Vi trùng gây viêm thân s ng đĩa đ m bao g m: t c u vàng (80-90%), E. coli và proteus th ng g p b nh nhân có nhi m trùng h th ng, Pseudomonas aeruginosa và Klebsiella là vi khu n gram âm cũng đ c tìm th y.

Có 3 đ ng vào:

- Nhiễm trùng qua đường máu: đường máu là đường lây lan phổ biến nhất.
- Nhiễm trùng từ nhiễm trùng khác: các nhiễm trùng đường tiêu hóa, viêm phổi, viêm phần mềm cơ nh sống được xem là nhiễm trùng nguyên phát gây ra viêm đĩa đệm vùng thắt lưng.
- Tiêm chích trực tiếp vào đĩa đệm đốt sống: ít thường xuyên hơn so với những nguyên nhân khác, trong khi nhiễm trùng sau phẫu thuật là quan trọng nhất.



[Xem tiếp tại đây](#)