

Bs. Trần Quốc Dũng -

ĐỐI CỐI NG

Xạ trị giảm nhẹ triệu chứng được áp dụng để giảm triệu chứng trong trường hợp khi u phát triển quá lớn, xâm lấn nhiều cơ quan, hoặc di căn với mục đích là làm giảm khả năng tàn phá của khối u và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Mục đích của xạ trị giảm nhẹ triệu chứng:

- Giảm đau.
- Giảm chèn ép.
- Kiểm soát ung thư đang loét và giảm chảy máu.
- Giảm kích thích khối u để giảm áp lực hoặc tắc nghẽn.
- Điều trị các triệu chứng của các khối u trong não.
- Điều trị giảm nhẹ trong những trường hợp bệnh nhân có chất sống hoạt động kém.

Phác đồ và thời gian xạ trị tùy thuộc vào thời trạng bệnh nhân, loại ung thư và tình trạng bệnh.

Xạ trị giảm nhẹ triệu chứng cần được thực hiện sớm nhất có thể, việc mô phỏng và lập kế hoạch điều trị càng sớm càng tốt.

Xạ trị giảm nhẹ triệu chứng cũng đòi hỏi nhiều khả năng như xạ trị trị liệu.



Xét tra giám nhận triu chng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 14:54 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 16 Tháng 5 2023 14:58

[Xem tiếp tại đây](#)