

Xơ phổi vô căn

Vị trí bài Biên tập viên

Thứ 01, 31 Tháng 5 2023 15:20 - Lần cập nhật cuối Thứ 01, 31 Tháng 5 2023 15:45

Bs Hs Ths Thúy Hằng

Định nghĩa

Xơ phổi vô căn (IPF) là bệnh mạn tính, tiến triển với đặc điểm phát triển từ chức năng phổi dần dần suy giảm chức năng phổi và chức năng trao đổi khí ở phổi theo thời gian, mà không rõ nguyên nhân.


Xơ phổi vô căn là nhóm bệnh gồm một số nhóm viêm phổi kẽ vô căn. Tỷ lệ IPF tăng lên theo tuổi, thường gặp ở người trên 60 tuổi. Bệnh cũng thường gặp nhiều hơn ở nam giới và phần lớn người bệnh có tiền sử hút thuốc lá. Mặc dù tỷ lệ mắc IPF không cao, nhưng đó là một gánh nặng bệnh tật lớn với người bệnh, gia đình và xã hội. Xơ phổi vô căn dần dần suy giảm chức năng phổi và tiên lượng xấu hơn bệnh hen suyễn thông thường, thời gian sống thêm trung bình sau chẩn đoán là 2-3 năm, thời kỳ sống ở mức giai đoạn bệnh, với chi phí điều trị cao.

Tuy nhiên chẩn đoán và điều trị bệnh phổi vô căn còn nhiều thách thức. Bệnh tiến triển nhanh và dần dần thời kỳ sống với tiên lượng xấu hơn so với nhiều bệnh ung thư. Xơ phổi vô căn tiến triển khó để đoán. Bệnh mất chức năng phổi không thể hồi phục cho dù ở bất kỳ giai đoạn nào. Mất chức năng phổi liên quan đến tỷ lệ đột tử cao và nguy cơ thời kỳ sống cao. Điều trị xơ phổi vô căn làm tăng tỷ lệ thời kỳ sống, giảm thời gian sống thêm.

X ã ph ã i vô căn

Vi ã t b ã i Biên t ã p viên

Th ã t ã , 31 Tháng 5 2023 15:20 - L ã n c ã p nh ã t cu ã i Th ã t ã , 31 Tháng 5 2023 15:45



[Xem ti ã p ti ã i ã y](#)