

Bs Nguyễn Tiến -

**CÓ CẦN THIẾT SINH THIẾT HẸ THẸ NGẸCHO TẸ T CẸ CÁC BẸNH NHÂN NGHI NGẸ UNG
THẸ TUYẸN TIẸN LIẸ TẸ TRONG KẸ NGUYẸN SINH
THẸ T NHẸ MẸ C TIẸU MRI-TRUS HAY KHÔNG?**

Ung thư tuyến tiền liệt (PCa) là ung thư đứng đầu trong chẩn đoán phân biệt nam trên toàn thế giới, sau ung thư phổi và ung thư vú và là ung thư đứng hàng thứ năm gây tử vong ở nam giới. Để chẩn đoán ung thư thì không có gì khác là phải tìm ra được các bằng chứng gì đó ở bệnh nhân mô tuyến tiền liệt. Sinh thiết hẸ thẸ ng (SBx) tuyến tiền liệt (TTL) đã được sử dụng từ lâu. Tuy nhiên không phải PCa nào cũng có ý nghĩa lâm sàng, vì có phát hiện có thể dẫn tới điều trị quá đà, cũng như gây ra lo lắng cho bệnh nhân (BN). Sinh thiết trúng mục tiêu (TBx), được biết là với hỗ trợ của MRI đã được triển khai từ những năm đầu thập kỷ 20, là xu hướng phát triển mạnh mẽ trong chẩn đoán ung thư TTL và hướng dẫn sinh thiết TTL.

PI-RADS™ v2.1 Assessment Categories

PI-RADS 1 – Very low (clinically significant cancer is highly unlikely to be present)

PI-RADS 2 – Low (clinically significant cancer is unlikely to be present)

PI-RADS 3 – Intermediate (the presence of clinically significant cancer is equivocal)

PI-RADS 4 – High (clinically significant cancer is likely to be present)

PI-RADS 5 – Very high (clinically significant cancer is highly likely to be present)

[Xem tiếp tại đây](#)