

Bs Tr n Minh Quang -

I/T NG QUAN

T i l s d ng kháng sinh cao ch y u c các đ n v chăm sóc đ c bi t. Th t không may, h u h t đ u đ c s d ng không đúng cách đ n đ n gia tăng vi khu n đa kháng thu c. Ng i ta bi t r ng đ i u tr theo kinh nghi m ban đ u b ng kháng sinh ph r ng làm gi m t i t v ng. Tuy nhiên, vi c s d ng kháng sinh kéo dài và không h p lý còn có th làm tăng nguy c ng đ c, t ng tác thu c và tiêu ch y do Clostridium difficile. M t s chỉ n l c đ s d ng h p lý các thu c kháng sinh bao g m tránh đ i u tr xâm l n, gi m leo thang, theo dõi n ng đ thu c trong huy t thanh, th i gian đ i u tr thích h p và s d ng các đ u hi u sinh h c. T ng quan này th o lu n v tính hi u qu c a các chỉ n l c này, t m quan tr ng c a ki n th c vi sinh, xem xét có các tác nhân kháng Staphylococcus aureus và Klebsiella pneumoniae, đ ng th i gi m vi c s d ng kháng sinh và tình tr ng kháng vi khu n mà không nh h ng đ n t i t v ng.

Dosage	Initial dose should be calculated according to weight, as 25-30mg/kg
	Subsequent doses based on serum concentration
	More effective and practical method
Serum level	Should be obtained immediately before the fourth dose, for patients with normal kidney function
Recommendation: 15-20mg/dL every 8 to 12 hours	

Recommendations by the Infectious Diseases Society of America (2009) to adjust therapeutic

dose of vancomycin

[Xem tiếp tại đây](#)