
Vi□t b□i Biên t□p viên
Th□ năm, 18 Tháng 6 2015 20:53 - L□n c□p nh□t cu□i Th□ sáu, 19 Tháng 6 2015 10:30

Ths Lê Văn Tu□n - Khoa ICU

Gi□i thi□u

Các ch□n β th□□ng đ□□c s□ d□ng trong đi□u tr□ b□nh tim m□ch, giúp gi□m nguy c□ nh□i máu tái phát và t□ vong sau nh□i máu c□ tim. Trong th□c t□, thu□c làm gi□m tiêu th□ oxy c□a c□ tim và do đó làm gi□m m□c đ□ thi□u máu c□c b□ tim. Hai th□ nghi□m đ□i ch□ng ng□u nhiên ch□ng minh r□ng vi□c s□ d□ng chu ph□u ch□n β có th□ làm gi□m đáng k□ t□ l□ m□c các bi□n ch□ng tim m□ch, t□ l□ m□c b□nh và t□ vong sau ph□u thu□t tim. Tuy nhiên, nh□ng k□t qu□ này không đ□□c xác nh□n trong ba th□ nghi□m đ□i ch□ng ng□u nhiên ti□p theo cũng nh□ trong m□t nghiên c□u thu□n t□p l□n. T□□ng t□ nh□ v□y, m□t nghiên c□u đánh giá thi□u máu c□c b□ chu ph□u POISE nh□n th□y các b□nh nhân s□ d□ng metoprolol succinate 30 ngày tr□□c khi ph□u thu□t đã gi□m nguy c□ nh□i máu c□ tim sau ph□u thu□t so v□i nhóm ch□ng nh□ng l□i tăng nguy c□ đ□t qu□ và t□ vong có liên quan đ□n s□ gia tăng tình tr□ng h□ huy□t áp, nh□p tim ch□m và xu□t huy□t. Trong nh□ng năm qua, nh□ng k□t qu□ đáng ng□c nhiên đã d□n đ□n nhi□u thay đ□i khác nhau trong h□□ng d□n th□c hành; C□ th□, g□n đây năm 2014 h□□ng d□n c□a H□i tim m□ch M□ (AHA) khuy□n cáo r□ng ch□n β chu ph□u ch□ nên dùng □ nh□ng b□nh nhân đ□□c coi là có nguy c□ thi□u máu c□c b□ c□ tim trung bình ho□c cao.


ESMOLOL
HCl INJECTION
FOR IV USE
100 mg/10 mL
(10 mg/mL)
Rx ONLY
NDC 55390-062-10
10 mL Single Dose Vial
Usual Dosage: See package insert.
Each mL contains 10 mg esmolol HCl and water for injection. Buffered with 2.8 mg sodium acetate trihydrate and 0.546 mg glacial acetic acid. Sodium hydroxide and/or hydrochloric acid added to adjust pH.
Contains no preservatives.
Discard unused portion.
Manufactured for:
Bedford Laboratories™
Bedford, OH 44146
ESM-V02