

Ths Trần Thị Minh Thanh - Khoa Nội Tiêu hóa

1. Định nghĩa

Barrett thực quản được đặt tên theo một nhà ngoại khoa người Úc Norman Barrett, năm 1950 ông đã mô tả hiện tượng mô bình hành niêm mạc bị thay thế bằng mô thực quản này. Tuy nhiên, sự gọi thích của ông cho thời điểm phát hiện này thì không chính xác. Sau 20 năm, mô tả mô bình hành của thực quản Barrett thay đổi đáng kể.

Barrett thực quản là tình trạng khi các tế bào bình thường lót phần dưới của thực quản (gọi là các tế bào vảy) được thay thế bởi một loại tế bào khác (gọi là tế bào đường ruột). Hiện tượng này được gọi là chuyển số ruột, thường là do tiếp xúc lặp đi lặp lại với acid dạ dày.

Barrett thực quản thường được chẩn đoán bằng nội soi người có bệnh trào ngược dạ dày thực quản lâu dài (GERD: Gastro Esophageal Reflux Disease), trào ngược mãn tính acid dạ dày vào thực quản vùng trên. Chỉ có một tỷ lệ phần trăm nhỏ của những người bị GERD sẽ phát triển thành thực quản Barrett.

Barrett's esophagus

Viết bởi Biên tập viên

Chỉnh sửa, 25 Tháng 10 2015 10:31 - Lần cập nhật cuối: Chỉnh sửa, 25 Tháng 10 2015 10:45

