

## Băng huyết sau sanh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17

---

*Băng huyết sau sanh (BHSS) là một biến chứng thường gặp và là nguyên nhân dẫn đến tử vong và biến chứng cho bà mẹ. Một phần nhỏ khi mẹ có thể tử vong trong vòng 2h từ lúc xuất hiện băng huyết nếu không được xử trí kịp thời. Một trong những yếu tố góp phần gây tử vong mẹ do BHSS cao là do việc đánh giá lượng mất máu mẹ trong lúc sanh chưa đúng mức, phần lớn là phát hiện và xử trí khi đã quá giai đoạn nặng (Chẩn đoán muộn, mất máu nghĩa là mất dòng chảy các yếu tố đông máu). Ngoài ra những yếu tố khác cũng góp phần gây tử vong mẹ như thiếu hụt lượng tiểu nhân chuyên, khả năng chẩn đoán và xử trí, máu, thuốc co hồi tử cung, dịch truyền...*



**I. ĐỊNH NGHĨA:** BHSS là chảy máu đường sinh dục nhiều hơn 500ml trong sanh đường âm đạo, > 1000ml trong mổ lấy thai. Trong thai kỳ bình thường, nồng độ hemoglobin gia tăng tích máu nên vào những tháng cuối của thai kỳ nồng độ máu có thể gia tăng 30- 60%, tổng lượng đường 1000- 2000ml ở thai phụ có cân nặng trung bình. Do đó đánh giá lượng mất máu mẹ sau sanh không quan trọng bằng việc đánh giá sự thay đổi tình trạng sức khỏe của sản phụ. Một số sản phụ bị thiếu máu thiếu sắt, cao huyết áp thai kỳ, dinh dưỡng kém.. nên khi mất ít hơn 500ml máu đã bị choáng, vì vậy cần đánh giá tình huống để can thiệp kịp thời.

## Bảng huyết sau sanh

Vị trí biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17

### II. Xếp Loại:

**1. Theo thời gian:** Chảy máu xảy ra trong 24h đầu sau sanh được gọi là BHSS sớm hay BHSS nguyên phát. Chảy máu xảy ra sau 24h đến 6 tuần đầu sau sanh được gọi là BHSS muộn hay BHSS thứ phát.

### 2. Theo đánh giá máu mất:

**2.1 Lượng máu mất:** Theo ICD- 10- AM, BHSS khi lượng máu mất khi sanh ngã âm đạo  $\geq 500\text{ml}$  và khi mổ lấy thai  $\geq 750\text{ml}$ .

**2.2 Thay đổi Hematocrit:** Theo Hiệp hội SPK Hoa Kỳ, giảm 10% so với giá trị Hct trước sanh có giá trị chẩn đoán BHSS.

**2.3 Số máu mất nhanh hay chậm:** BHSS được xem là trầm trọng khi lượng máu mất  $> 150\text{ml/phút}$  ( trong 20 phút số mất  $> 50\%$  thể tích máu) hoặc mất tổng cộng  $> 1500- 200\text{ml}$ .

### 2.4 Dựa vào thể tích máu mất ( theo phân loại Benedetti)

| Nhóm | Lượng máu mất | %      |
|------|---------------|--------|
| 1    | 900ml         | 15     |
| 2    | 1200- 1500    | 20- 25 |
| 3    | 1800- 2100    | 30- 35 |
| 4    | 2400          | 40     |

## Bảng huyết sau sanh

Vị trí bài biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17

---

### 2.5 Xếp loại theo nguyên nhân:

#### *a. BHSS nguyên phát*

\* **Độ trương (Tonus)** chỉ m 75-90% tr ờ ng h p

- T c c c q a m c : đ thai, đ i, con to

- S d ng thu c gi n c TC: nifedipin, Mangesium, beta- minetics, indomethacin, nitric oxide.

- Chuy n d q a nhanh hay kéo dài

- Gi c sanh lâu v i Oxytocin

- Viêm màng i

- S d ng thu c m Halothane

- U x TC

\* **Sót nhau, mô (Tissue)**

- Sót nhau, u x TC nhi u nhân

## Bảng huyết sau sanh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17

---

- Bứt tung nhau: bánh nhau phồng, nhau bám chặt, nhau cài răng lược.

- Có sẹo mổ cũ trên tử cung: bóc nhân xơ, MLT

- Giai đoạn nhau kéo dài

- Dây rốn căng quá mức

### \* Tình trạng đẻ sinh dục (Trauma)

- Tình trạng âm hộ, âm đạo

- Cắt tử cung sinh môn rách hay rách tử cung sinh môn

- Thai to, sanh nặng, can thiệp thủ thuật

- Vết tử cung

### \* Rối loạn đông máu (Thrombin)

- Giảm tiểu cầu trong hội chứng HELLP, CIVD (sản giật, thai lưu, nhiễm trùng huyết, nhau bong non, truyền tủy).

## Bảng huyết sau sanh

Vị trí biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17

---

- Di truyền: bệnh Von Willebrand

- Điều trị kháng đông: thay van, đang mang thai ghép.

### **BHSS thường phát:**

- Nhiễm khuẩn tử cung

- Sốt nhau

- Sự thoái hóa bất thường của vị trí nhau bám

### **2.6 Xét nghiệm dựa vào lâm sàng và triệu chứng:**

| Lượng máu mất |            | HA          | Dấu hiệu và triệu chứng              |
|---------------|------------|-------------|--------------------------------------|
| %             | ml         | mmHg        |                                      |
| 10- 15        | 500- 1000  | Bình thường | Hồi hộp, chóng mặt, nhịp tim nhanh   |
| 15- 25        | 1000- 1500 | Giảm nhẹ    | Mệt lả người, toát mồ hôi, tim nhanh |
| 25- 35        | 1500- 2000 | 70- 80      | Vật vã, tái nhợt, thiếu niệu         |
| 53- 45        | 2000- 3000 | 50- 70      | Trụy mạch, thở hức, vô niệu          |


### **2.7 Bệnh đường xu hướng theo Benedetti**

## Bảng huyết sau sanh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17




| Phân độ                    | Lượng máu mất | Thể tích máu mất | Dấu hiệu                                                             |
|----------------------------|---------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 0                          | < 500ml       | < 10%            | Không                                                                |
| <b>ĐƯỜNG BẢO ĐỘNG</b>      |               |                  |                                                                      |
| 1                          | 500- 1000ml   | 15%              | Ít thay đổi                                                          |
| <b>ĐƯỜNG HÀNH ĐỘNG (1)</b> |               |                  |                                                                      |
| 2 (2)                      | 1200- 1500ml  | 20- 25%          | Thiếu niệu<br>Mạch nhanh nhỏ<br>Thở nhanh<br>Hạ huyết áp theo tư thế |
| 3 (3)                      | 1800- 2100ml  | 30- 35%          | Hạ huyết áp<br>Mạch nhanh<br>Người lạnh, ẩm<br>Thở nhanh             |
| 4 (4)                      | > 2400ml      | > 40%            | Shock                                                                |



## Băng huyết t sau sanh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17





Hệ thống Scanlon, B-Lynch, và B-Lynch là những kỹ thuật băng huyết sau sinh. Băng huyết sau sinh là tình trạng mất máu quá nhiều sau khi sinh con. Băng huyết sau sinh có thể gây nguy hiểm đến tính mạng của mẹ. Băng huyết sau sinh có thể được ngăn ngừa bằng cách tiêm thuốc vào tử cung ngay sau khi sinh con.

### Bảng huyệ̣t sau sanh


Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17



© Copyright S-Lynch '05

**Posterior view**


[illegible]

## Băng huyết t sau sanh

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 12 Tháng 6 2012 17:35 - Lần cập nhật cuối Thứ ba, 25 Tháng 9 2012 09:17

---



Đang tải hình ảnh. Nếu bạn gặp lỗi, làm ơn tải lại trang. [Tải ảnh khác](#)