

Hồ Thị Mai-YHND

Viêm não Nhật Bản là bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền theo đường máu, do virus viêm não Nhật Bản gây ra. Bệnh có đặc điểm lâm sàng là hội chứng nhiễm trùng nhiễm độc toàn thân nặng cùng với sự phát triển của viêm não nặng và tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh có thể xuất hiện rải rác quanh năm, nhưng chủ yếu vào tháng 5, 6, 7 là tỷ lệ mắc bệnh cao. Đây là thời điểm Viêm Não Nhật Bản bắt đầu vào mùa và kéo dài cho đến hết tháng 10.

Theo Bệnh viện Nhi Đồng I, mức độ chửa bệnh vào đường tiêu hóa của bệnh Viêm Não Nhật Bản không bệnh nhân nhập viện điều trị viêm não tăng nhanh. Trung bình 2 tuần khoảng 5-6 triệu mắc. trong khi nhiều cha mẹ lại không biết được nguyên nhân cũng như triệu chứng của bệnh.

I. Nguyên nhân :

1. Tác nhân gây bệnh

Virus viêm não Nhật Bản.

2. Nguồn truyền

Đường vật nhiễm virus có vai trò là nguồn truyền nhiễm bệnh VNNB cho người.

Nguồn truyền nhiễm trong thiên nhiên là loài chim, trong đó có một số loài ăn quạ với quạ nhàn

nhu tu hú, liêu điếu.

Người truyền nhiễm gần gũi là một số loài gia súc, trong đó quan trọng nhất là lợn nhà.

3. Đường lây

- Là đường máu, qua trung gian truyền bệnh là muỗi Culex là chủ yếu


- Muỗi đốt súc vật bị nhiễm và sau đó truyền bệnh khi đốt trẻ em.

- Ở Việt Nam loài muỗi Culex tritaeniorhynchus sinh sản mạnh vào mùa hè (nhất là từ tháng 3 đến tháng 7), hoạt động mạnh vào buổi chiều tối. Loài muỗi này có mật độ cao ở vùng đồng bằng và trung du, nó là trung gian truyền bệnh chủ yếu bệnh viêm não Nhật Bản ở nông thôn.

Viêm não Nhật Bản

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 20 Tháng 6 2017 13:29 - Lần cập nhật cuối: Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 08:15



Viêm não Nhật Bản

Viết bởi Biên tập viên

Thứ ba, 20 Tháng 6 2017 13:29 - Lần cập nhật cuối Thứ tư, 21 Tháng 6 2017 08:15

