

Bs Lê Thanh Hà-Khoa Mắt

Một nghiên cứu mới đây cho thấy có nhiều bệnh nhân khô mắt do tăng thoát hít không hoàn toàn (partial blinking) và có thể liên quan đến chung của bệnh Meibomius.

Theo báo cáo của điều tra viên việc phát hiện và đánh lồng tiếng số lần chớp mắt không hoàn toàn và luyến tlop chớp mắt có thể đóng vai trò quan trọng trong điều trị tăng thoát hít không hoàn toàn.

David Murakami (ở Morrisville, North Carolina) và Korb Associates (ở Boston) đã báo cáo kết quả nghiên cứu này trong hội nghị thัmonting năm 2014.

Tiến sĩ Murakami đã trả lời phỏng vấn Medscape Medical News: "Chớp mắt không hoàn toàn có mối liên quan chặt chẽ với khô mắt do tăng thoát hít không hoàn toàn. Do trong xã hội ngày nay, chúng ta có thói quen không chớp mắt vì nhìn quá chăm chú vào máy tính, điện thoại di động, chơi game. Và nếu bạn không chớp mắt một cách hoàn toàn(complete blinking) bạn không ép mắt ra khỏi tuyêt Meibomius. Chúng tôi có hàng trăm bệnh nhân khô mắt do tăng thoát hít không hoàn toàn đang theo chung trình tự chớp mắt."

