

Bs CK2 Nguyễn Thị Kiều Trinh-Khoa Phẫu sản

Khoa Sản có nhiều vấn đề liên quan đến Bệnh lý về việc chuyển dạ không gây tê tuỷ sống (GTTS) trong mổ lấy thai các trường hợp nhau tiền đạo trung tâm, bán trung tâm, nhau bong non, tiền sản giật nặng, sản giật... vì có nguy cơ cao xảy ra mất sản tại bệnh viện chuyển tủy môch, ngừng tim, rối loạn đông máu, suy đa tạng. Bệnh lý này, ekip gây mê tại Khoa Phẫu thuật gây mê tại bệnh viện cũng thường xuyên gây mê nội khí quản mất sản bệnh lý tim môch hoặc các bệnh đã kể trên hoặc cần phẫu thuật lấy thai nhanh như sa dây rau... Còn lại, đa số phương pháp vô cảm là gây tê tuỷ sống trong mổ lấy thai.


Vậy mà mấy ngày qua, tit bài báo: BỆNH LÝ TỬ CUNG GÂY TÊ TỬ CUNG TRONG MỔ LẤY THAI xuất hiện rất nhiều trên các trang báo mạng và thông tin này được share rất nhiều trên Facebook.



Các bác sĩ sản khoa như mình đâm lo vì các thông tin như vậy gây ra rất nhiều hoang mang cho các thai phụ và người nhà. Bởi lẽ họ chưa được đầu tư mà không hiểu rõ thông tin bên trong chỉ nói về một số bệnh như lâm sàng của chúng chưa được như trong gây tê tuỵ sống. Phẫu thuật pháp vô cảm cho sản phụ thích hợp cho mổ lấy thai phẫu thuật vào mổ, thai nhi và các yếu tố sản khoa.

Trong thực hành hiện nay, gây tê trước mổ kinh bao gồm gây tê tuỵ sống và gây tê ngoài màng cứng là phẫu thuật pháp hiện tại có xu hướng ngày càng tăng ở các nước Mỹ, Anh và các nước phát triển từ năm 2001 trở lại đây. Hội Gây mê hội sản Việt Nam cũng xem đây là một phẫu thuật pháp vô cảm trong mổ lấy thai nếu không có các bệnh lý đặc biệt.

Gây mê toàn thân được sử dụng trong trường hợp chúng ta phẫu thuật như gây tê trước mổ kinh vì lý do bệnh lý, các bệnh như đã nêu trên hay thời gian không cho phép. Nếu kiểm soát huyết áp tốt thì GTTS trong mổ lấy thai đem lại thuận lợi cho các sản phụ như ít biến chứng so với gây mê toàn thân như sản phụ dễ nôn, như cơn đau rõ hơn, ít mất nhiều nước trong gây mê toàn thân như tình trạng mất máu do cung gò kém ít hơn, tình trạng tiêu hoá tốt hơn, ho, sốt, suy hô hấp ít hơn, sản phụ tỉnh thức nhanh hơn, là yếu tố thuận lợi cho phẫu thuật pháp da mổ cũng như các sản phụ vận động sớm hơn trong thời gian hậu phẫu. Bởi vì một phẫu thuật pháp nào cũng có tác động ngoại ý, tuy nhiên nếu kiểm soát tốt thì gây tê tuỵ sống vẫn là phẫu thuật pháp an toàn trong vô cảm khi mổ lấy thai. Tuy nhiên cần phải tôn trọng các chúng ta phẫu thuật như đã không xảy ra tai biến cho sản phụ.



Đặt catheter gây tê tủy sống và dẫn thuốc gây tê tủy sống vào ống tủy sống để gây tê tủy sống.