

Nên sử dụng adrenalin ngay cả khi sốc phản vệ chưa xác định

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 11:41 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 13:57

ThS. Lê Thị Đĩnh - Khoa ICU

Các chuyên gia đồng ý rằng, dùng ngay ngay nếu nghi ngờ sốc phản vệ epinephrine để phòng sốc phản vệ có thể, ngay cả khi không có bằng chứng cho thấy các triệu chứng của bệnh nhân là kết quả của một phản ứng dị ứng. "Epinephrine với liều liều thích hợp là an toàn, và không có chứng cứ để nghi ngờ bất lợi cho việc sử dụng nó trong điều trị sốc phản vệ", theo một tuyên bố được thu thập được từ bốn bài báo của các chuyên gia gồm các bác sĩ cấp cứu, hồi sức và chuyên ngành dị ứng. Các nhà nghiên cứu báo cáo trong một bài báo đăng trên tạp chí *Annals of Allergy, Asthma and Immunology*, "Sử dụng trong việc dùng epinephrine có thể dẫn đến sốc phản ứng quá nặng và trở nên kháng trị". Theo Viện Quốc gia về Bệnh Dị ứng và Nhiễm khuẩn, Dị ứng Thấp cấp và sốc phản vệ Hoa Kỳ, "Không cần thiết phải có tiêu chuẩn để đáp ứng sốc phản vệ epinephrine".

Nên sử dụng adrenalin ngay cả khi chưa có chẩn đoán xác định

Viết bởi Biên tập viên

Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 11:41 - Lần cập nhật cuối Thứ bảy, 26 Tháng 8 2017 13:57

