

Bs CKII Trần Lâm - Trưởng khoa Nội tim mạch

Cùng với nghiên cứu CANTOS khẳng định giả thuyết viêm cấp tính và đường mạch và chứng minh rằng IL-1 β là một đích điều trị mới của bệnh tim mạch do xơ vữa, nghiên cứu SPRINT đã ghi nhận một đích huyết áp mới dành cho bệnh nhân tăng huyết áp, nghiên cứu CULPRIT-SHOCK cũng là một trong những vấn đề nổi bật của tim mạch học trong năm 2017.

Trong những bệnh nhân (BN) bệnh nhồi máu cơ tim (NMCT) với choáng tim, việc tái thông sớm đường mạch thông qua can thiệp mạch vành qua da (PCI) sớm có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do BN. Tuy nhiên, phần lớn (80%) BN NMCT với choáng tim bệnh nhân thường có nhiều nhánh mạch vành, và tỷ lệ tử vong cao hơn so với chỉ tắc nghẽn 1 nhánh. Vậy, chúng ta nên can thiệp đường mạch thông qua hay là can thiệp ngay luôn những nhánh không thông? Vấn đề vẫn còn nhiều bàn cãi!

UNIVERSITÄT LEIPZIG
HERZZENTRUM

Multivessel PCI in Cardiogenic Shock European and American Recommendations 2017




Multivessel coronary artery disease present in up to 80% → higher mortality


Guidelines



Appropriate Use Criteria



Ibanez et al. ESC STEMI Guidelines 2017. Eur Heart J 2017; epub
Levine et al. J Am Coll Cardiol 2016;67:1235-1250
Patel et al. J Am Coll Cardiol 2016; in press



Nghiên cứu Culprit-Shock, một trong những câu chuyện nổi bật của tìm kiếm học trong năm 2017

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 15 Tháng 1 2018 20:06 -

[Xem tiếp tại đây](#)