

Bs Đinh Trọng Giang - Khoa ICU


I. ĐỐI CƯỢNG

1. Khái niệm: Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và tắc động mạch phổi được coi là hai biểu hiện của cùng một quá trình bệnh lý, gọi là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

2. Tình hình thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu ở bệnh nhân hội sốc tích cực đang diễn biến.

Tắc động mạch phổi cấp và/hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu (TĐMP/HKTMS) là một biến chứng nặng của bệnh nhân điều trị ở các chuyên khoa khác nhau. Nguy cơ này được biết tăng cao khi bệnh nhân phải nằm điều trị dài ngày và hội sốc tích cực. Biến chứng TĐMP/HKTMS làm tăng nguy cơ tử vong, tàn phế và chi phí điều trị của bệnh nhân lên cao hơn. Tỷ lệ HKTMS khoa Hồi sức tích cực (HSTC) từ 28-32% [1], [3], tỷ lệ này cao hơn nhóm bệnh nhân chấn thương 60% [3], và được biết cao ở bệnh nhân đái tháo đường 70% [4], [5], [6].

VTE (venous thromboembolism): deep vein thrombosis and pulmonary embolism



[Xem tiếp tại đây](#)