

Bs Đinh Trọng Giang-Bs Nguyễn Hoàng Kim Ngân - Khoa ICU


I. ĐỐI CƯỢNG

1. Khái niệm: Huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới và tắc đông mạch phổi được coi là hai biểu hiện liên quan có chung một quá trình bệnh lý, gọi là thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch.

2. Tình hình thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch sâu và bệnh nhân hồi sức tích cực đang điều trị.

Tắc đông mạch phổi cấp và/hoặc huyết khối tĩnh mạch sâu (TĐMP/HKTMS) là một biến chứng nặng của bệnh nhân điều trị ở các chuyên khoa khác nhau. Nguy cơ này được biết tăng cao khi bệnh nhân phải nằm điều trị dài ngày và/hoặc sử dụng thuốc chống đông. Bệnh chứng TĐMP/HKTMS làm tăng nguy cơ tử vong, tàn phế và chi phí điều trị của bệnh nhân lên cao hơn. Tỷ lệ HKTMS khoa Hồi sức tích cực (HSTC) từ 28-32% [1], [3], tỷ lệ này cao hơn nhóm bệnh nhân chấn thương 60% [3], và được biết cao ở bệnh nhân đột quỵ 70% [4], [5], [6].

VTE (venous thromboembolism): deep vein thrombosis and pulmonary embolism



[Xem tiếp tại đây](#)