


Bs Trần Quốc Chiên - Trưởng khoa ung bướu

Hầu hết bệnh nhân ung thư buồng trứng sơ có tình trạng bệnh học tiên tiến dai dẳng hoặc tái phát sau điều trị ban đầu. Nhóm bệnh nhân này sẽ cần được điều trị lại. Ung thư buồng trứng không phải là một thực thể đồng nhất. Có một chuỗi các biến số khác nhau về tính cách. Một số lan rộng và tính đồng nhất của khối u nguyên phát thường sai khi không chỉ tiến trình tự nhiên của ung thư mà còn sai khi nó cần những biến số tiếp theo sau đó.

Theo dõi thường xuyên chặt chẽ để tìm u có thể phát hiện tình trạng bệnh tái phát. Ở phụ nữ ung thư buồng trứng đã được điều trị trước đó mà có thuyên giảm và một lâm sàng, Mạng lưới ung thư toàn diện quốc gia (National Comprehensive Cancer Network) đã khuyến nghị đo nồng độ CA125 vào mỗi lần thăm khám theo dõi nếu nồng độ này đã tăng lên từ thời điểm chẩn đoán ban đầu. Sau đó nếu CA125 tăng lên ở phụ nữ mắc ung thư buồng trứng, thời gian trung bình bệnh tái phát trên lâm sàng là 2 đến 6 tháng.



[Ung thư buồng trứng là gì? Nguyên nhân, triệu chứng, chẩn đoán, điều trị và phòng ngừa](#)