

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh- Khoa Phẫu Sản

1. Định nghĩa: Bí tiểu sau sinh (BTSS) là tình trạng không đi tiểu được sau sinh 6 giờ, thường kèm theo đau bụng dữ dội, có hay không có cơn bàng quang và cơn thông tiểu để giảm triệu chứng

2. Phân loại:

2.1. BTSS có triệu chứng (30%) không đi tiểu được trong vòng 6 giờ sau sinh hoặc sau khi tháo ống thông tiểu.

2.2. BTSS không triệu chứng(70%): triệu chứng bí tiểu không rõ ràng, thể tích tiểu niệu nhỏ hơn $< 150\text{ml}$.

2.3. BTSS kéo dài: tình trạng không đi tiểu được kéo dài, phải đặt ống thông tiểu nhiều ngày, chỉ mất $\approx 0,05\%$.

Bí tiểu u sau sinh, sau m

Viết bởi Biên tập viên

Thứ sáu, 20 Tháng 7 2018 08:47 -



3. Nếu sau khi sinh con, bạn cảm thấy đau đớn khi đi tiểu, đây có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường thai kỳ. Nếu bạn có các triệu chứng như khát nước, đi tiểu thường xuyên, hoặc cảm thấy mệt mỏi, hãy đi khám bác sĩ ngay lập tức để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.