

Bs Đoàn Hoàng - Khoa Nội Thận-Nội tiết

Thêm bằng chứng rằng hợp vi cấu trúc "thận trọng" metformin không chỉ an toàn cho bệnh nhân tiểu đường loại 2 và bệnh thận mãn tính như đã được chứng minh mà còn có lợi ích (CKD) đang nổi lên.

Một phân tích mới về hai nhóm bệnh nhân hội chứng Hoa Ké cho thấy không có mối liên quan đáng kể giữa liều pháp metformin và nồng độ axit lactic trong máu, một dấu hiệu có thể liên quan đến suy thận (eGFR) thấp hơn là 30 mL / phút / 1,73 m².

Tuy nhiên, nồng độ axit lactic trong máu của những người dùng metformin với nồng độ eGFR từ 30 đến 44 hoặc 45 đến 59 mL / phút / 1,73 m² có thể so sánh với nồng độ của bệnh nhân khỏe mạnh bao gồm đối tượng trước và sau metformin, theo Benjamin Lazarus, MBBS, MPH, tại Johns Hopkins Trường Y tại Công cộng Bloomberg, Baltimore, Maryland và các đồng nghiệp.

Trong trường hợp này sau khi kiểm soát các biến số như tuổi tác, tình trạng bệnh lý kèm theo, yếu tố nguy cơ tim mạch, nồng độ bicarbonate huyết thanh, và thuốc điều trị, bao gồm insulin, các tác giả nghiên cứu cho biết trong báo cáo của họ đăng trên JAMA Internal Medicine vào 4/7/2018.

