

Bs Nguyễn Thị Kiều Trinh -

1. Giới thiệu

Mô tử đầu tiên về bệnh nguyên bào nuôi trong thai kỳ (gestational trophoblastic disease: GTD) là của Hippocrates vào khoảng năm 400 trước Công nguyên. Marchand phát hiện ra mối liên quan của bệnh này với thai kỳ vào năm 1895. Mô tử bào nuôi khác mô nh mô nh thâm nhập vào nội mạc tử cung, tạo ra một khối thối rữa máu tử cung phong phú, dẫn đến sảy sót kết nối chặt chẽ giữa thai nhi và mô, đôi khi gọi là nhau thai. Tuy nhiên, trong bệnh nguyên bào nuôi, các cơ chế di truyền hòa trộn nên rời lỏng chức năng, dẫn đến các khối u xâm lấn, mô ch máu và di căn.

GTD liên quan đến các thể thối lành tính và ác tính bao gồm thai trứng (toàn phần và bán phần), ung thư nguyên bào nuôi, thai trứng xâm lấn, khối u nguyên bào nuôi dạng biểu mô (epithelioid trophoblastic tumor: ETT) và khối u nguyên bào nuôi vị nhau bám (placental site trophoblastic tumor PSTT). Bệnh phần cuối cùng được gọi là u nguyên bào nuôi thai kỳ (gestational trophoblastic neoplasia GTN); tất cả đều có thể di căn và có thể gây tử vong nếu không được điều trị.

PHÂN LOẠI GTD

Phân loại GTD theo WHO (2002)

Những tổn thương thai trứng

Thai trứng

Toàn phần

Bán phần

Xâm lấn

Những tổn thương không phải thai trứng

Ung thư nguyên bào nuôi (Choriocarcinoma)

U NBN nơi nhau bám (Placental site trophoblastic tumor)

U NBN dạng biểu mô (Epithelioid trophoblastic tumor)

[Xem tiếp tại đây](#)