

Bs Huân Thạc Sĩ Nguyễn

U trùng di chuyển qua da (CLM: Cutaneous larva migrans) là một hội chứng với hình ban và sọc tía với trí xâm nhập, tiếp theo là viêm da đỏ nâu hình đường đốm ngứa mòn quanh co dẹt da. Thông thường xảy ra do nhiễm u trùng của giun móc chó hoặc mèo, *Ancylostoma braziliense* hoặc *Ancylostoma caninum*; cũng có thể do u trùng của các ký sinh trùng đường ruột khác không phải là ký sinh trùng tự nhiên ở người.

CLM do giun móc thường được gọi là u trùng di chuyển qua da liên quan đến giun móc (HrCLM).

DỊCH THỰC

Giun móc gây ra sởi da của u trùng qua da (CLM) được phân bố trên toàn thế giới, thường gặp hơn ở các vùng khí hậu ẩm ướt, đặc biệt là ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới của Đông Nam Á, Châu Phi, Nam Mỹ, Caribe và các vùng đông nam của Hoa Kỳ. U trùng được tìm thấy trên các bãi biển cát, trong hộp cát nhà.

Những người có nguy cơ cao bao gồm khách du lịch, trẻ em, người bơi lội và người lao động có hoạt động khiếm da tiếp xúc với đất ẩm. HrCLM là nguyên nhân phổ biến của bệnh da liễu ở những người trở về sau chuyến du lịch ở các vùng nhiệt đới.


Vòng đời

Vòng đời giun móc trong vật chủ chính là rết giun ngứa với vòng đời giun móc cho loài người

Bệnh u trùng da di chuyển

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 20:17 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 20:22



Bệnh u trùng da di chuyển

Viết bởi Biên tập viên

Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 20:17 - Lần cập nhật cuối Thứ năm, 06 Tháng 5 2021 20:22

