


### BS TR<sub>o</sub>N QU<sub>o</sub>C CHI<sub>o</sub>N *Ng<sub>o</sub>n:Harrison's principle of internal medicine*

#### I/ T<sub>o</sub>n su<sub>o</sub>t và nguyên nhân.

Ung th<sub>o</sub> th<sub>o</sub>c qu<sub>o</sub>n không th<sub>o</sub>ng g<sub>o</sub>p nh<sub>o</sub>ng l<sub>o</sub>i là b<sub>o</sub>nh lý ác tính gây t<sub>o</sub> vong quá m<sub>o</sub>c. Vi<sub>o</sub>c ch<sub>o</sub>n đoán đã đ<sub>o</sub>c th<sub>o</sub>c hi<sub>o</sub>n trên 16640 ng<sub>o</sub>i M<sub>o</sub> trong năm 2010 và đ<sub>o</sub>a đ<sub>o</sub>n 14500 tr<sub>o</sub>ng h<sub>o</sub>p t<sub>o</sub> vong. Trên toàn th<sub>o</sub> gi<sub>o</sub>i, t<sub>o</sub>n su<sub>o</sub>t c<sub>o</sub>a ung th<sub>o</sub> th<sub>o</sub>c qu<sub>o</sub>n r<sub>o</sub>t khác nhau. Nó th<sub>o</sub>ng x<sub>o</sub>y ra trong m<sub>o</sub>t ph<sub>o</sub>m vi đ<sub>o</sub>a lý r<sub>o</sub>ng t<sub>o</sub> b<sub>o</sub> nam c<sub>o</sub>a bi<sub>o</sub>n Capsi<sub>o</sub> ph<sub>o</sub>ng Tây đ<sub>o</sub>n phía b<sub>o</sub>c Trung Qu<sub>o</sub>c ph<sub>o</sub>ng Đông và bao g<sub>o</sub>m các ph<sub>o</sub>n c<sub>o</sub>a Iran, Trung Á, Afghanistan, Siberia và Mongolia. S<sub>o</sub> gia tăng v<sub>o</sub> nguy c<sub>o</sub> gia đình đã đ<sub>o</sub>c th<sub>o</sub>y nh<sub>o</sub>ng vùng có t<sub>o</sub>n su<sub>o</sub>t cao m<sub>o</sub>c đ<sub>o</sub>u s<sub>o</sub> liên quan v<sub>o</sub> gene thì ch<sub>o</sub>a đ<sub>o</sub>c xác đ<sub>o</sub>nh. Các “túi” t<sub>o</sub>n su<sub>o</sub>t cao c<sub>o</sub>a b<sub>o</sub>nh cũng th<sub>o</sub>ng hi<sub>o</sub>n đ<sub>o</sub>n nh<sub>o</sub>u đ<sub>o</sub>a ph<sub>o</sub>ng khác nhau nh<sub>o</sub> Finland, Iceland, Curaçao, đông nam châu phi và tây b<sub>o</sub>c Pháp. B<sub>o</sub>c M<sub>o</sub> và Tây Âu, b<sub>o</sub>nh th<sub>o</sub>ng g<sub>o</sub>p nh<sub>o</sub>ng ng<sub>o</sub>i da đen h<sub>o</sub>n ng<sub>o</sub>i da tr<sub>o</sub>ng và nam h<sub>o</sub>n n<sub>o</sub>, nó th<sub>o</sub>ng xu<sub>o</sub>t hi<sub>o</sub>n nh<sub>o</sub>u nh<sub>o</sub>t t<sub>o</sub> tu<sub>o</sub>i sau 50 và th<sub>o</sub>ng liên quan v<sub>o</sub> i đ<sub>o</sub>u ki<sub>o</sub>n kinh t<sub>o</sub> xã h<sub>o</sub>i th<sub>o</sub>p h<sub>o</sub>n.



**Bảng 91-1. Một vài yếu tố nguyên nhân được tin là có liên quan với ung thư thực quản.**

|                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiêu thụ rượu quá mức                                                                                                                                                                                                    |
| Hút thuốc lá                                                                                                                                                                                                             |
| Các chất sinh ung thư được đưa vào khác <ul style="list-style-type: none"><li>- Nitrate (được biến đổi thành Nitrit)</li><li>- Hút thuốc phiện</li><li>- Các độc tố của nấm trong rau chua</li></ul>                     |
| Các tổn thương từ các tác nhân vật lý. <ul style="list-style-type: none"><li>- Trà nóng</li><li>- Uống dung dịch kiềm</li><li>- Các tổn thương hẹp gây ra bởi tia xạ</li><li>- Bệnh cơ trơn không dẫn mạn tính</li></ul> |
| Sự cảm nhận của chủ thể                                                                                                                                                                                                  |
| Đường gờ thực quản trong bệnh viêm lưỡi do thiếu vitamin A và thiếu sắt (ví dụ như hội chứng Plummer- Vinson hay hội chứng Paterson-Kelly)                                                                               |
| Tăng sừng hóa bẩm sinh và nốt lõm ở gan bàn tay và gan bàn chân (ví dụ như sự tạo chai ở gan bàn tay và gan bàn chân)                                                                                                    |
| Sự thiếu hụt các chất như selen, molipden, kẽm và vitamin A trong chế độ ăn                                                                                                                                              |
| Bệnh Spru bụng                                                                                                                                                                                                           |
| Trào ngược dạ dày (ví dụ như bệnh thực quản Barrett) gây ung thư biểu mô tuyến.                                                                                                                                          |