

Bs Lê Thị Ngọc Thành Vi -

I. ĐỐI CƯỢNG

Bệnh nhân phẫu thuật hậu môn trực tràng thường xuyên gặp phải các biến chứng sau mổ, và những biến chứng này có thể dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn, kết quả kém hơn và mất ung thư hơn, các biến chứng kèm theo như u hạt và chèn ép đường ruột cũng suy giảm. Các biến chứng ngày càng được công nhận là thang điểm đánh giá chất lượng chăm sóc y tế, trình độ chuyên môn của các trung tâm phẫu thuật. Vì vậy việc tìm kiếm chất lượng trong phẫu thuật hậu môn trực tràng đã xác định được các phương pháp để giảm thiểu biến chứng và cải thiện kết quả cho nhóm bệnh nhân này. Trong thời gian lại không xa sẽ tiếp tục xác định các phương pháp điều trị tốt nhất và các cách thức tiêu chuẩn hóa để đo lường chất lượng chăm sóc bệnh nhân nhằm giảm biến chứng hậu phẫu cho bệnh nhân phẫu thuật hậu môn trực tràng.

Phẫu thuật hậu môn trực tràng có liên quan mật thiết với các biến chứng và tử vong cao so với các chuyên ngành phẫu thuật tổng quát khác. Tỷ lệ tử vong chung sau phẫu thuật đại trực tràng từ 1% đến 16,4%, với tỷ lệ biến chứng từ 35%. Theo Alves A, Panis Y, Mathieu P, Manton G et al, sau khi phẫu thuật đại trực tràng, bệnh nhân có nguy cơ tử vong từ 2% đến 5,8%. Tỷ lệ biến chứng sau phẫu thuật đáng kể ở nhóm bệnh nhân này đã được nghiên cứu rộng rãi trong những năm xác định các lĩnh vực để cải thiện chất lượng và ngày càng được quan tâm bởi các nhà lâm sàng cũng như các trung tâm y khoa. Thời gian phẫu thuật vùng hậu môn với tỷ lệ biến chứng cao, những biến chứng biến chứng nặng nề không phải biến chứng ở bệnh nhân phẫu thuật vùng hậu môn.

Biến chứng sau phẫu thuật hậu môn trực tràng

Viết bởi Biên tập viên

Thứ hai, 25 Tháng 7 2022 15:45 - Lần cập nhật cuối Thứ hai, 25 Tháng 7 2022 16:11



[Xem tiếp tại đây](#)